

Склад

- декаметоксин -1,0 мг;
- гіалуронат натрію - 25,0 мг;
- лактатний буфер рН 3,8-4,5 - 5,0 мл.

Опис

Вагінальний гель ГІНОДЕК 0,5% містить декаметоксин і гіалуронову кислоту. Гель має однорідну в'язку консистенцію, не має запаху. Гель підтримує рН і вологість слизової піхви, завдяки чому допомагає формувати нормальну мікрофлору, захищає від різних інфекцій, усуває дискомфорт і сухість в статевих органах. Декаметоксин має антимікробну, протигрибкову дію і концентрується на цитоплазматичній мембрані (ЦПМ) мікробної клітини і з'єднується з фосфатидними групами ліпідів мембран, порушуючи проникність ЦПМ мікроорганізмів. Декаметоксин має високу активність щодо мікроорганізмів, стійких до антибіотиків. Декаметоксин не всмоктується слизовими оболонками, нешкодливою шкірою і поверхнею рани. Гіалуронова кислота має властивість зв'язувати воду, ніж забезпечує підтримку вологості в слизовій оболонці піхви.

Показання

Гель рекомендується при інфекційно-запальні захворювання статевих органів, профілактика інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним втручанням, малих діагностичних операціях, перед пологами, штучним перериванням вагітності, до і після установки ВМС). Так само гель дуже ефективен в станах, що супроводжуються сухістю слизової оболонки піхви (дистрофічні зміни слизової оболонки в постменопаузі, роздратування, печіння, свербіж в результаті частих спринцювань, захворювань шлунково-кишкового тракту, прийому антибіотиків, гормонів, контрацептивів). Для полегшення природних пологів, для захисту промежини під час пологів. При передчасних пологах, після розриву амніотического мішка. Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, які входять до складу гелю.

Спосіб застосування та дози

1. Поверніть пломбу проти годинникової стрілки і видаліть її.

2. Наконечник контейнера ввести в положенні сидячи або лежачи якомога глибше в піхву.
3. Видавити вміст контейнера в піхву.

Рекомендована доза при станах, що супроводжуються сухістю слизової оболонки піхви та інфекційно-запальних захворюваннях статевих органів становить 5 мл 1-2 рази на добу, курс лікування – 7-10 днів.

Для профілактики інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології рекомендована доза становить 5мл.

Для полегшення природних пологів, для захисту промежини під час природних пологів, при передчасних пологах, після розриву амніотичного мішка рекомендована доза становить 5 – 30 мл. Гель вводять під час вагінальних обстежень під час пологів, починаючи з першого вагінального обстеження. При кожному вагінальному обстеженні необхідно нанести 3-5 мл гелю на стерильну рукавичку і рівномірно розподілити цю кількість по родовим шляхам. Для кращого нанесення можна використовувати вагінальний аплікатор.

Додаткове введення гелю слід проводити через 15-30 хвилин після розриву амніотичного мішка. Кількість, необхідна для одних пологів, в середньому становить від 10 до 30 мл гелю.

Для профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, рекомендується застосовувати 5мл гелю не більше ніж через 2 години після незахищеного полового акту.

Побічні реакції

У разі виникнення подразнення піхви, припиніть використання та зверніться до лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 30°C. Не заморожувати.

Упаковка

По 5 мл в полімерних контейнерах, по 7 шт в упаковці.

Виробник

ТОВ «Юрія-Фарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна 18030, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108.