

Склад

діючі речовини: 1 г гелю містить Rhus toxicodendron extern 0,05 г; Ledum extern 0,05 г; Symphytum ad usum externum 0,10 г;

допоміжні речовини: натрію гідроксид, карбомер, вода очищена.

Лікарська форма

Гель.

Основні фізико-хімічні властивості: жовто-коричневого кольору гомогенний, прозорий гель із солодкуватим, трохи пряним запахом.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Препарат містить три активні інгредієнти, які доповнюють один одного при лікуванні ревматичного болю у м'язах і суглобах, болючих напружень і розтягнень м'язів, а також люмбаго (біль у попереково-крижовому відділі хребта). Rhus toxicodendron добре зарекомендував себе в лікуванні суглобного ревматизму, що розвився внаслідок застуди, промокання або перенапруження зі зменшенням болючих симптомів при русі. Активна речовина Ledum ефективна головним чином при ревматоїдному болю у дрібних і великих суглобах, а також при схильності до подагри. Завдяки впливу Ledum знімається перенапруження опорної мускулатури хребта, а також потиличних і плечових м'язів. Завершує комбінацію Symphytum, який також застосовується при болючих симптомах у суглобах і здавна вважається гомеопатичним засобом для лікування кісток і суглобів.

Показання

Ревматичні та дегенеративні захворювання м'язів та суглобів, болісне напруження та розтягнення м'язів, а також люмбаго (біль у попереково-крижовому відділі хребта).

Протипоказання

Не застосовувати при підвищеній чутливості до *Rhus toxicodendron* (сумаху отруйного) та до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Дотепер не виявлена. Якщо пацієнт застосовує будь-який інший лікарський засіб, слід попередити про це лікаря.

Особливості застосування

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку пацієнту слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем. У разі затяжного перебігу захворювання або неясних, нових скаргах або гострих станах, що супроводжуються почервонінням, набряком або гіперемією суглоба, пацієнту слід проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування препарату. Слід уникати контакту з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами. Слід вимити руки після нанесення гелю. Якщо пацієнт не почуває себе краще, необхідно звернутися до лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Ревма-Гель у період вагітності або годування груддю слід застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Спосіб застосування та дози

При гострих симптомах захворювання дорослим та дітям віком від 1 року наносити гель 3 рази на добу на болючі місця тонким шаром, злегка втираючи в шкіру. Тривалість застосування препарату – не більше 2 тижнів.

При хронічному перебігу захворювання наносити гель 1-2 рази на добу на болючі місця тонким шаром, злегка втираючи у шкіру. Кількість препарату, яка наноситься, не має перевищувати 10-15 мм витиснутої із тубика смужки гелю. Якщо після 1-2 тижнів лікування препаратом не спостерігається терапевтичного ефекту, пацієнту слід звернутися до лікаря.

Діти

Через недостатність клінічних даних не рекомендується застосовувати препарат дітям віком до 1 року.

Передозування

Шкідливі дії підвищених доз невідомі.

Побічні реакції

Зрідка можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, подразнення шкіри, свербіж, шкірні висипання. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій пацієнту необхідно припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 г гелю у тубі, по 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).