

Склад

діюча речовина: камфора рацемічна;

1 мл розчину містить камфори рацемічної 0,1 г;

допоміжна речовина: олія соняшникова.

Лікарська форма

Розчин олійний 10 %, нашкірний.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора масляниста рідина жовтого кольору із запахом камфори.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовують місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ M02A X10.

Фармакодинаміка

Камфорна олія при місцевому застосуванні чинить протимікробну, протизапальну, відволікаючу, знеболювальну дію та усуває свербіж шкіри. Ці властивості зумовлені наявністю у молекулі камфори функціонально активної молекули кисню, яка має високий окиснювальний потенціал, порушує клітинні мембрани мікроорганізмів, руйнує багато активних сполук, що спричиняють запалення, біль і подразнення чутливих рецепторів шкіри.

Фармакокінетика

Не вивчалася.

Показання

Призначати при ревматизмі, артритих, артралгії, міозитах, міалгії, ішіасі, шкірному свербіжі.

Протипоказання

Бронхіальна астма, пошкодження шкіри при опіках, порушення цілісності шкіри, гнійничкові захворювання шкіри. Підвищена індивідуальна чутливість до

компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Взаємодія поки що невідома.

Особливості застосування

Камфорна олія є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не досліджувалася.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосовувати з урахуванням співвідношення користь для жінки / ризик для плода (дитини), яке визначає лікар.

Спосіб застосування та дози

Камфорну олію застосовувати зовнішньо дорослим як окремо, так і в комбінації з метилсаліцилатом, скипидаром та іншими лікарськими засобами для місцевого застосування. Застосовувати зовнішньо для розтирання і компресів при зазначених патологічних процесах. Спосіб застосування, кількість аплікацій, тривалість однієї аплікації зумовлені характером захворювання, його вираженістю, характером супутньої терапії.

Діти

Не застосовувати дітям через відсутність клінічного досвіду.

Передозування

Можливе посилення проявів побічних реакцій, відчуття сильного тепла та печіння.

При випадковому потраплянні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання.

Побічні реакції

З боку шкіри: алергічні реакції, включаючи шкірні висипи, кропив'янку, свербіж, подразнення шкіри, почервоніння, дерматит, в тому числі контактний дерматит.

З боку нервової системи: судоми.

З боку системи дихання: бронхоспазм.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 мл у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).