

Склад

діючі речовини: 100 г препарату містять

Moschus moschiferusD30 - 0,5 г;
Moschus moschiferusD6 - 0,5 г;
Moschus moschiferusD200 - 0,5 г;
Strychnos ignatiiD4 - 0,5 г;
Strychnos ignatiiD30 - 0,5 г;
StrychnosignatiiD10 - 0,5 г;
Strychnos ignatiiD200 - 0,5 г;

допоміжні речовини:

етанол 96%;
вода очищена.

Лікарська форма

Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий (при зберіганні можливе утворення пластівчасті осаду) безбарвний розчин із запахом етанолу.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Препарат виявляє седативну, спазмолітичну, антидепресивну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного і тваринного походження, які входять до складу препарату.

Показання

- Депресія, особливо екзогенного походження;
- парадоксальні симптоми;
- істерична афонія.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат. Якщо симптоми або погіршенні стану, в разі задишки, гнійного мокротиння, лихоманки або болю при диханні необхідно проконсультуватися з лікарем.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Зазвичай не впливає, але слід враховувати наявність у складі препарату етанолу.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Через недостатність належного задокументованого досвіду застосування, препарат можна застосовувати в період вагітності або годування груддю лише після консультації з лікарем. Токсичність в період вагітності або годування груддю гомеопатично розведених речовин, які входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена. Ніяких небажаних реакцій не виявлено.

Спосіб застосування та дози

Разова доза: дорослим і дітям від 12 років - 10 крапель, від 2 до 6 років - 5 крапель, від 6 до 12 років - 7 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їжі.

Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик). У гострих випадках спочатку необхідно приймати вікову разову дозу кожні 30-60 хвилин протягом першої доби, але не більше 9 разів на добу. Далі приймати вікову разову дозу 3 рази на добу. Тривале застосування препарату (протягом декількох місяців і довше) слід проводити під наглядом лікаря. Зазвичай курс лікування - 3-6 тижнів, але тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Діти

Через недостатність належного задокументованого досвіду застосування, даний лікарський засіб не слід застосовувати дітям віком до 12 років без призначення

лікаря.

Передозування

Не відмічалось.

Побічні реакції

У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций.

Термін придатності

5 років. Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Біологише Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).