

Склад

діючі речовини: 1 мл препарату містить водно-спиртовий екстракт (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) із суміші: моркви дикої плодів (*Dauci carotae fructus*) 200 мг, ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 180 мг, споришу трави (*Polygoni avicularis herba*) 150 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea maydis styli cum stigmatis*) 120 мг, бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 100 мг, хвоща трави (*Equiseti herba*) 100 мг, хмелю шишок (*Lupuli flos*) 50 мг, берези бруньок (*Betulae gemmae*) 50 мг, звіробою трави (*Hyperici herba*) 40 мг, м'яти листя (*Menthae piperitae folia*) 10 мг;

допоміжні речовини: крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма

Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-коричневого кольору зі специфічним ароматним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.

Фармакотерапевтична група

Засоби, які застосовуються в урології. Код ATX G04B X.

Фармакодинаміка

Комбінований препарат рослинного походження. Комплекс біологічно активних речовин Урохолуму, легко всмоктуючись у кров та стимулюючи нирковий та печінковий кровообіг, сприяє збільшенню сечо- та жовчовиділення, нормалізує тонус гладенької мускулатури верхніх сечовивідних шляхів і жовчного міхура, послаблює запальні процеси, чинить бактерицидну, діуретичну, жовчогінну, спазмолітичну дії.

Урохолум чинить антиазотемічний ефект, виводить з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди. Сприяє виведенню піску та каменів з нирок, сечового та жовчного міхурувів.

Показання

У складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань (неспецифічної інфекції) сечовивідних шляхів (цистит, уретрит) та нирок (пієлонефрит), хронічних неінфекційних захворювань нирок (нефрит, нефроз); сечокам'яна,

нирковокам'яна хвороби та сольовий діатез (профілактика утворення конкрементів, в т.ч. після їх видалення); хронічний холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Зміна реологічних властивостей крові, обтураційна жовтяниця.

Особливі заходи безпеки

З обережністю застосовувати пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (через можливе виникнення та/або посилення печії).

Не застосовувати препарат, якщо діаметр каменів перевищує 3 мм.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлена.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Під час лікування слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат не застосовують у період вагітності та годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати перед вживанням їжі по 10-20 крапель, розводячи невеликою кількістю води, тричі на добу.

Курс лікування визначається лікарем із врахуванням перебігу захворювання, характеру супутньої терапії та триває від 5 діб до 1 місяця. За призначенням лікаря курс терапії можна повторити.

Перед застосуванням збовтати, оскільки при зберіганні можливе утворення осаду.

Діти

Препарат не застосовують дітям віком до 12 років.

Передозування

Посилення побічних реакцій.

Лікування: при передозуванні необхідно призначити велику кількість теплого пиття та провести симптоматичне лікування.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у т.ч. висипання, свербіж, гіперемія, набряк шкіри), запаморочення, диспептичні явища (нудота, блювання).

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 мл у флаконі в пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру](#)

лікарських засобів України.