

Склад

діючі речовини: на 10 мл розчину аргініну цитрата - 1,0 г, бетаїну - 1,0 г;

допоміжні речовини: моногідрат лимонної кислоти, сахароза, сорбат калію, виноградний ароматизатор, очищена вода.

Властивості

Бетаргін - біологічно активна добавка, яка містить бетаїн і аргінін. Засіб відновлює нормальне функціонування печінки, після пошкодження токсичними речовинами, в тому числі і алкоголем.

Бетаргін позитивно впливає на роботу серця і судинної системи, покращує стан клітин печінки, зменшує кількість ліпідних відкладень в гепатоцитах, активізує ферменти, які сприяють окисненню і виведенню ксенобіотиків та інших токсинів.

Аргінін - незамінна амінокислота, яка володіє наступними ефектами:

- бере участь у метаболізмі сечовини і сприяє виведенню продуктів обміну білкового синтезу;
- підвищує синтез азоту, завдяки чому нормалізує тонус судинної системи;
- запобігає шкідливому впливу вільних радикалів;
- покращує мікроциркуляцію і трофіку в печінці;
- стабілізує гемодинаміку і сприяє насиченню тканин і органів киснем;
- регулює роботу гепатоцитів і підвищує їх регенерацію;
- знімає запалення і мінімізує вплив гіпоксії на гепатоцити;
- володіє антиоксидантними властивостями.

Бетаїн є ліпотропною речовиною, бере участь в синтезі фосфоліпідів і володіє наступними властивостями:

- сприяє відновленню клітинних мембран гепатоцитів;
- покращує виведення окиснених жирних кислот і транспорт тригліцеридів;
- запобігає розвитку жирової дистрофії печінки, атеросклерозу, утворенню тромбів в судинах;
- зменшує концентрацію гомоцистеїну;
- має протизапальні і антифібротичні властивості.

Іони цитрату, які містяться в Бетаргіні, сприяють процесу травлення при підвищеній кислотності шлункового соку, зменшують ацидоз, усувають диспептичні прояви (нудота, відчуття тяжкості в шлунку, метеоризм), які часто відзначають при захворюваннях печінки.

Показання

Дорослим - з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи та попередження наслідків гепатотоксичної дії алкоголю та токсинів, поліпшення функції серцево-судинної системи;

дітям віком від 3-х років - з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, для попередження наслідків інтоксикації, при ацетонемічному синдромі.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів; цукровий діабет; жовчнокам'яна і сечокам'яна хвороби; вагітність і годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не досліджувалась.

Особливості застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Бетаргін не слід використовувати як замітник повноцінного раціону харчування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Бетаргін не приймають в період вагітності та годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Рекомендована доза становить 1 саше (1 контейнер) 1-3 рази на день, залежно від захворювання і ступеня його тяжкості. Вміст саше (контейнера) попередньо необхідно розвести в 100 мл теплої води. Застосовують Бетаргін після їжі, бажано в один і той же час доби.

Дітям старше 3 років Бетаргін призначають по 1-2 саше (контейнера) на добу. Вміст саше (контейнера) розводять в 100 мл води і приймають по 1 чайній ложці

кожні 10-15 хвилин.

Діти

Засіб призначають дітям від 3 років.

Передозування

Немає даних про передозування.

Побічні реакції

Небажані реакції можуть виникнути в осіб із підвищеною чутливістю до компонентів засобу. Найчастіше у таких пацієнтів спостерігається висип і свербіж шкіри, нудота, блювання, порушення стулу, диспептичні розлади, головний біль, біль в животі.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 мл у саше; по 20 саше у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Фарматіс С.А.С., Франція.