

Склад

діючі речовини:

2,2 мл розчину містить: Acidum alpha-ketoglutaricum D10 – 22 мг, Acidum fumaricum D10 – 22 мг, Acidum malicum D10 – 22 мг, Acidum oroticum monohydricum D6 – 22 мг, Acidum thioccticum D8 – 22 мг, Avena sativa D6 – 22 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D28 – 22 мг, Chelidonium majus D5 – 22 мг, Cinchona pubescens D4 – 22 мг, Colon suis D10 – 22 мг, Cyanocobalaminum D4 – 22 мг, Cynara scolymus D6 – 22 мг, Duodenum suis D10 – 22 мг, Hepar suis D8 – 22 мг, Histaminum D10 – 22 мг, Lycopodium clavatum D4 – 22 мг, Natrium diethyloxalaceticum D10 – 22 мг, Pankreas suis D10 – 22 мг, Silybum marianum D3 – 22 мг, Sulfur D13 – 22 мг, Taraxacum officinale D4 – 22 мг, Thymus suis D10 – 22 мг, Veratrum album D4 – 22 мг, Vesica fellea suis D10 – 22 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий і практично вільний від часток, від безбарвного до злегка рожевого кольору розчин без запаху.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Препарат відновлює дезінтоксикаційну функцію печінки, чинить гепатопротекторну, жовчогінну, регенеруючу, метаболічну, антиоксидантну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

Показання

У комплексному лікуванні дискінезії жовчовивідних шляхів, гострих та хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів, порушень функції печінки при різних соматичних захворюваннях, а також внаслідок довготривалої дії різних токсичних факторів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих, у т.ч. до розторопші плямистої, кульбаби лікарської, артишоку посівного, або до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Взаємодія невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Особливості застосування

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Випадки впливу невідомі.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат не застосовують у період вагітності або годування груддю у зв'язку з наявністю у складі чистотілу (*Chelidonium*) та чемериці (*Veratrum*).

Спосіб застосування та дози

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 2,2 мл, дітям віком від 3 до 6 років – 1 мл. Застосовувати 1 – 3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, а у разі необхідності – внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій, а також в акупунктурні точки.

Курс лікування – 3 – 6 тижнів.

Діти

Препарат застосовують дітям віком від 3 років.

Передозування

Не відзначалося.

Побічні реакції

У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості, у тому числі шкірні реакції, кропив'янка, гіперемія шкіри; підвищення температури тіла, неспокій. У таких випадках необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка

5 (5x1) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).