

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 флакон містить настойки квіток календули (*Calendulae flores*) (1:10), (екстрагент – етанол 70%) – 40 мл.

## **Лікарська форма**

Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина жовтаво-коричневого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати, що сприяють загоюванню.

Код АТХ D03A X.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини, що містяться у квітках та квіткових кошиках календули (флавоноїдні та каротиноїдні глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, ефірна олія, органічні кислоти), чинять протимікробну, протизапальну та помірну жовчогінну дію.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалась.

## **Показання**

Місцевий антисептичний засіб при інфікованих (гнійних) ранах, порізах, опіках шкіри та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт), глотки, мигдаликів (фарингіт, ангіна), внутрішньо – як жовчогінний засіб при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холангітах, холециститах (у складі комплексної терапії).

## **Протипоказання**

Календули настойка протипоказана при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Календули настойка посилює дію інших протизапальних та жовчогінних засобів (зокрема препаратів на основі ромашки та деревію). При застосуванні одночасно з будь-якими іншими лікарськими засобами слід повідомити лікаря.

### **Особливості застосування**

Препарат містить спирт! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Слід утримуватися від керування транспортом або роботи з іншими механізмами у період застосування препарату внутрішньо.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати внутрішньо у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

Календули настойку застосовувати внутрішньо за 15–30 хвилин до їди, розводячи у невеликій кількості теплої кип'яченої води. Дорослим рекомендується застосовувати по 10–20 крапель настойки 3–4 рази на день протягом 1 місяця. Дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля настойки на 1 рік життя 3–4 рази на добу.

Для полоскання порожнини рота 1 чайну ложку календули настойки розводять у стакані теплої кип'яченої води.

Спосіб застосування препарату для місцевих аплікацій залежить від характеру ураження шкіри і визначається лікарем.

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого терапевтичного ефекту та переносимості препарату.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

### **Діти**

Не застосовувати дітям віком до 12 років через вміст етанолу.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

*З боку імунної системи.* Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи почервоніння шкіри, висипи, свербіж, ангіоневротичний набряк.

*З боку органів травлення.* При прийомі внутрішньо можливе відчуття гіркоти в роті, відчуття печіння в епігастральній ділянці, біль у животі.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря!

## **Термін придатності**

4 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 40 мл у флаконі.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).