

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 мл препарату містить: гліцерину у перерахуванні на 85 % 0,25 г; аміаку розчину 10 % 0,25 мл; етанолу 96 % 0,25 мл;

*допоміжна речовина:* вода очищена.

## **Лікарська форма**

Рідина нашкірна.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина із запахом аміаку.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТХ D02A X.

## **Фармакодинаміка**

Лікарський засіб має протизапальну та антисептичну дію, покращує еластичність шкіри.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалася.

## **Показання**

Застосовують при сухості шкіри рук та тріщинах.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату; виразкові, гнійничкові, травматичні ушкодження шкіри рук.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Взаємодія невідома.

## **Особливості застосування**

Не порушувати правила застосування лікарського засобу. Запобігати потраплянню в очі та на слизові оболонки. Не застосовувати при тріщинах сосків молочної залози.

При випадковому потраплянні Дермасану на слизові оболонки ока - промивати водою декілька разів (протягом 15 хвилин з перервою 10 хвилин) або 3 % розчином борної кислоти. Якщо лікарський засіб потрапив у ніс і глотку, застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі випадкового прийому внутрішньо - пити воду, фруктовий сік, молоко, краще - 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Впливу на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами не виявлено.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Не рекомендується застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

Застосовують зовнішньо для дорослих. Препарат втирати у чисто вимиту з милом та добре висушену рушником шкіру рук 2 - 3 рази на день.

Термін застосування зумовлений досягнутим ефектом.

### **Діти**

Досвід застосування препарату для лікування дітей відсутній.

### **Передозування**

Не виявлено.

### **Побічні реакції**

Подразнення, дерматити, екзема у місці аплікацій, алергічні реакції.

### **Термін придатності**

2 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 50 мл у флаконах.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).