

Склад

діючі речовини: 100 г сиропу містить складний рідкий екстракт (1:2) з: трави деревію (*Achillea millefolium* L. herba), трави шандри звичайної (*Marrubium vulgare* L. herba), листя меліси (*Melissae officinalis* L. folium), плодів фенхелю (*Foeniculum vulgare* Mill., fructus) (3/2/3/2), екстрагент – вода очищена – 15,0 г;

допоміжні речовини: концентрат апельсиновий, натрію бензоат, сахароза, вода очищена.

Лікарська форма

Сироп.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина чайного кольору із солодко-гірким смаком і своєрідним запахом.

Фармакотерапевтична група

Стимулятори апетиту. Код АТХ А15.

Фармакодинаміка

До складу сиропу входить екстракт лікарських трав, що містять гіркоти (трава шандри, листя меліси, трава деревію) і плодів фенхеля, які посилюють секрецію шлункового соку рефлексним шляхом. Препарат цього типу традиційно застосовують при відсутності апетиту.

Показання

Сироп Апетистим застосовується при відсутності апетиту.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якої допоміжної речовини або до рослин родини складноцвітих (*Asteraceae*).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Даних немає.

Особливості застосування

Якщо симптоми посиляться або не припиняться після 10 днів, слід розглянути питання про зміну лікування.

Пацієнти з рідкісними генетичними розладами, пов'язаними з непереносимістю фруктози, синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози або недостатністю сахарози-ізомальтази, не повинні приймати препарат.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Лікарський препарат Апетистим не впливає на здатність керувати автотранспортом і працювати з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Через відсутність достатніх даних не слід застосовувати сироп в період вагітності та годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Сироп приймають перорально, приблизно за півгодини до їди.

До упаковки додається мірний стаканчик, який полегшує дозування.

Діти віком від 3 до 6 років — по 2,5 мл 2 рази на день (мірним стаканчиком або ½ чайної ложки), діти віком від 6 до 18 років — по 5 мл 2-3 рази на день (мірним стаканчиком або 1 чайна ложка).

Дорослі — по 15 мл 3-4 рази на день (мірним стаканчиком або 1 столова ложка).

Діти

При застосуванні дітям дозу сиропу слід розбавити в невеликій кількості слабкого чаю.

Передозування

Не описано випадків передозування.

Побічні реакції

Побічні реакції представлені за системно-органною класифікацією MedDRA і частотою появи: дуже часто ($\geq 1 / 10$); часто ($\geq 1 / 100$ до $< 1/10$), не дуже часто ($\geq 1 / 1000$ до $< 1/100$), рідко ($\geq 1 / 10\,000$ до $< 1/1000$); дуже рідко ($< 1 / 10000$),

частота невідома (неможливо її визначити на підставі доступних даних).

Розлади шкіри та підшкірної тканини (алергічні шкірні реакції) - частота невідома.

Розлади дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння (алергічні реакції з боку дихальної системи) - частота невідома.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25° С, у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Флакон із кольорового скла, який містить 125 г сиропу, з ковпачком HDPE, з мірним стаканчиком в коробці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Вроцлавське підприємство лікарських трав «Гербаполь» АТ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

вул. Св. Миколая 65/68, 50-951 Вроцлав, Польща.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).