

Склад

діючі речовини: йод, калію йодид, гліцерин;

1 г розчину містить: йоду – 0,01 г, калію йодиду – 0,02 г, гліцерину в перерахуванні на 100 % – 0,83 г;

допоміжні речовини: вода очищена.

Лікарська форма

Розчин для ротової порожнини.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

Фармакодинаміка

Люголя розчин з гліцерином чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

Показання

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок, виражена гіперфункція щитовидної залози, некомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні до та після дослідження або терапії).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

Особливості застосування

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат. Не допускати потрапляння препарату в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму, при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу – це може зашкодити здоров'ю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратом, змащувати уражені слизові оболонки глотки та гортані 3-4 рази на день.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 5 років.

Передозування

Можливі прояви йодизму: нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість.

Лікування. Негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

Побічні реакції

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 г у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).