

## **Склад**

*діючі речовини:* йод, калію йодид, гліцерин;

1 г розчину містить: йоду – 0,01 г, калію йодиду – 0,02 г, гліцерину в перерахуванні на 100 % – 0,83 г;

*допоміжні речовини:* вода очищена.

## **Лікарська форма**

Розчин для ротової порожнини.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинаміка**

Люголя розчин з гліцерином чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

## **Показання**

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок, виражена гіперфункція щитовидної залози, некомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні до та після дослідження або терапії).

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

### **Особливості застосування**

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат. Не допускати потрапляння препарату в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму, при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу – це може зашкодити здоров'ю.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратом, змащувати уражені слизові оболонки глотки та гортані 3-4 рази на день.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

*Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.*

### **Діти**

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 5 років.

### **Передозування**

Можливі прояви йодизму: нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість.

*Лікування.* Негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

### **Побічні реакції**

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 25 г у флаконах.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).