

Склад

діюча речовина: вільхи супліддя (*Alni fructus*);

1 пачка містить вільхи суплідь (*Alni fructus*) 100 г;

Лікарська форма

Супліддя.

Основні фізико-хімічні властивості:

цільна сировина: яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (шишки) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди; колір суплідь і гілочок темно-бурий або темно-коричневий; запах слабкий; смак в'яжучий;

подрібнена сировина: шматочки плодоніжок, лусочок, осей суплідь різної форми і плоди-горішки, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору; запах слабкий; смак в'яжучий.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини суплідь чинять в'яжучу, дезінфікуючу, протизапальну, десенсибілізуючу і кровоспинну дію; сприяють зменшенню бродильних і гнильних процесів при хронічних захворюваннях травного тракту, а також епітелізації слизових оболонок.

Показання

Гострі та хронічні ентерити, ентероколіти, коліти, диспепсії (у комплексному лікуванні).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

Цільна сировина: 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Подрібнена сировина: 1 столову ложку подрібнених суплідь помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Фільтр-пакети: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплом вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування

Передозування та тривале застосування викликає прояви гіперчутливості до препарату у вигляді алергічних реакцій.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висип, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Термін придатності

3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Супліддя по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.