

## **Склад**

діюча речовина: чистотілу трава (*Chelidonii herba*);

1 пачка містить: чистотілу трави (*Chelidonii herba*) 50 г.

## **Лікарська форма**

Трава.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листя, стебел, квіток та плодів різної форми. Колір світло-зелений, зелений, блакитно-зелений, сизуватий з яскраво-жовтими, жовтими, буруватими, зеленувато-коричневими, бурими або чорними вкрапленнями.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм. Код АТХ А16А Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини трави чистотілу чинять жовчогінну, спазмолітичну, болезаспокійливу, седативну, бактерицидну, сечогінну дію.

## **Показання**

У комплексному лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура (гепатитів, холангітів, холециститів) та захворювань шкіри (імпетиго, псоріазу, дерматитів, екзем).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Епілепсія, бронхіальна астма, стенокардія, органічні зміни печінки або нирок, неврологічні синдроми.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Особливості застосування**

Прийом препаратів чистотілу допустимий тільки за призначенням лікаря та під його наглядом.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Може впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами, враховуючи здатність препаратів чистотілу пригнічувати центральну нервову систему.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

### **Спосіб застосування та дози**

1 чайну ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по  $\frac{1}{4}$  склянки 2 рази на добу за 15 хв до їди.

1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати настій у теплому вигляді по  $\frac{1}{4}$  склянки 2 рази на добу за 15 хв до їди.

При захворюваннях шкіри застосування настою внутрішньо поєднувати із зовнішнім у вигляді примочок.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Курс лікування – 2-3 тижні.

### **Діти**

Протипоказано.

### **Передозування**

Унаслідок тривалого внутрішнього застосування препарату та в разі перевищення рекомендованих доз можливе запаморочення, отруєння з нудотою та блюванням, болем у шлунку; у тяжких випадках може розвинутися параліч дихального центру. При виникненні подібних симптомів слід припинити прийом

препарату, терапія симптоматична.

### **Побічні реакції**

При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, свербіж та висипання на шкірі), нудота, блювання, у тяжких випадках – параліч дихального центру. При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

### **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом.

### **Категорія відпуску**

За рецептом.

### **Виробник**

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.