

Склад

діюча речовина: пустирника трава (*Leonuri herba*).

1 пачка містить пустирника трави (*Leonuri herba*) 100 г.

Лікарська форма

Трава різано-пресована.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки циліндричної форми, поверхня гладенька, блискуча, зрідка матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір темно-зелений.

Фармакотерапевтична група

Снодійні та седативні засоби. Код АТХ N05C M.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять виражені седативні, спазмолітичні, гіпотензивні, кардіотонічні властивості; уповільнюють серцевий ритм, підвищують силу серцевих скорочень, одночасно знижуючи потребу серцевого м'яза у кисні.

Показання

Артеріальна гіпертензія легкого ступеня; надмірна нервова збудливість; неврози та неврозоподібні стани (у складі комплексної терапії).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Артеріальна гіпотензія, брадикардія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні може посилювати дію етанолу, седативних або снодійних засобів, серцевих глікозидів, аналгетичних, антигіпертензивних препаратів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

З обережністю слід застосовувати препарат при керуванні транспортом або роботі з іншими механічними засобами через можливе виникнення сонливості та запаморочення.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосовувати після консультації лікаря, який повинен оцінити співвідношення користі/ризика для плода/дитини.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку трави різано-пресованої помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Застосовувати препарат дітям віком від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування

При передозуванні можливі підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення, зниження артеріального тиску. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), кишкові розлади, підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.