

## **Склад**

*діюча речовина:* ефір полівінілбутиловий.

1 г Вініліну (Бальзаму Шостаковського) містить 1 г ефіру полівінілбутилового.

## **Лікарська форма**

Рідина нашкірна.

*Основні фізико-хімічні властивості:* густа, в'язка рідина від світло-жовтого до коричнево-жовтого кольору зі специфічним запахом. На повітрі не густіє і не висихає. Легко розчиняється у пропанолі і толуолі, практично не розчиняється у воді і спирті етиловому 96%. Зміщується у всіх співвідношеннях з етиловим ефіром, хлороформом, оліями і рідким парафіном.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби для лікування ран та виразкових уражень.

Код АТХ D03A X.

## **Фармакодинаміка**

Вінілін (Бальзам Шостаковського) має протимікробну дію, сприяє очищенню ран, регенерації та епітелізації тканин.

## **Фармакокінетика**

Антисептична дія зумовлена здатністю препарату дегідратувати мікробні клітини, викликаючи коагуляцію білка і загибель мікробних клітин. У результаті відновлення відбувається заміщення вогнищ некрозу специфічною та/або сполучною (має найвищий потенціал регенерації) тканиною.

## **Показання**

При фурункулах, карбункулах, трофічних виразках, гнійних ранах, пораненнях м'яких тканин, опіках, обмороженнях, дерматитах та запальних захворюваннях шкіри.

## **Протипоказання**

Індивідуальна підвищена чутливість організму до лікарського засобу.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не описана.

### **Особливості застосування**

Можна застосовувати у вигляді 20% олійного розчину, у тому числі у поєднанні з іншими сумісними з Вініліном лікарськими засобами (мазями на вазеліновій та інших основах, пастами та кремами).

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Відсутні дані про негативний вплив лікарського засобу на здатність керувати автотранспортом і обслуговувати рухомі механічні пристрої.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Інформація щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня, застосування препарату не рекомендується.

### **Спосіб застосування та дози**

Застосовують для змочування серветок і безпосереднього нанесення на уражену поверхню, в чистому вигляді або у вигляді 20% розчину на персиковій чи інших рослинних оліях, а також у мазах. Частота застосування – 3-5 раз на добу.

Курс лікування визначається лікарем індивідуально.

### **Діти**

Інформація щодо застосування препарату дітям відсутня, застосування препарату не рекомендується.

### **Передозування**

Симптоми передозування не описані.

### **Побічні реакції**

Дуже рідко - індивідуальна підвищена чутливість до препарату: можливі алергічні реакції, в основному місцевого характеру.

### **Термін придатності**

5 років.

### **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 100 г у банках або флаконах.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

АТ «ВІТАМІНИ».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).