

Склад

Індол-3-карбінол – 200,0 мг, прутняку екстракт – 100,0 мг, лактоза – 88,0 мг, кальцію стеарат – 8,0 мг, аеросил – 4,0 мг.

Опис

Індол-3-карбінол (ІЗС) має виражений позитивний ефект на дисгормональні захворювання молочних залоз. ІЗС сприяє вибіркового інгібування росту трансформованих клітин та індукції апоптозу. Антипроліферативна дія ІЗС реалізується декількома механізмами, основним з яких – нормалізація метаболізму і балансу естрогенів, зниження утворення патологічного метаболіту 16 α -гідроксиестрона, що має виражені канцерогенні властивості. ІЗС блокує як гормонзалежні, так і гормоннезалежні шляхи виникнення патологічної клітинної проліферації – нейтралізує дію епідермального і інсуліноподібного факторів росту, що стимулюють клітинну проліферацію в молочних залозах і матці, пригнічує ефект протизапальних цитокінів.

ІЗС відновлює роботу генів протипухлинного захисту BRCA, блокує синтез онкобілка E7 в епітеліальних клітинах, інфікованих вірусом папіломи людини.

Прутняк звичайний (Agnus Castus), маючи допамінергічний ефект, сприяє зниженню рівня пролактину, що опосередковано призводить до встановлення фізіологічного співвідношення жіночих статевих гормонів (естрогенів і прогестерону), поліпшення морфофункціонального стану молочних залоз, зниження утворення сполучної тканини в молочних залозах і запобігання розширенню молочних проток, купірування больового синдрому, нормалізації менструального циклу, пом'якшення симптомів передменструального синдрому, поліпшення психоемоційного стану.

Показання

Рекомендується як додаткове джерело індол-3-карбінолу, біологічно активних сполук прутняку звичайного. Сприяє нормалізації метаболічних процесів в молочних залозах у жінок. Маммодол призначають з метою поліпшення функціонального стану у жінок при фіброзно-кістозній мастопатії; мастодинії; передменструальному синдромі; порушеннях менструального циклу; з метою профілактики розвитку гіперпластичних процесів в молочних залозах.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, лактація, діти до 14 років. Не рекомендується одночасний прийом продуктів, що знижують кислотність шлунку.

Спосіб застосування та дози

Жінкам по 1-2 капсули на добу під час або після прийому їжі. Запивати достатньою кількістю води. Курс прийому – 3 місяці. В подальшому періодичність і тривалість застосування узгоджувати з лікарем.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ ВТФ Фармаком, Україна.