

Склад

1 капсула містить:

Активні інгредієнти:

- індол-3-карбінол - 200 мг;
- екстракт зеленого чаю - 82 мг (що еквівалентно епігаллокатехін-3-галлат - 45 мг).

Допоміжні речовини: наповнювачі (двоокис кремнію аморфний, магнію стеарат).

Оболонка капсули - желатин.

Опис

«Епігалін» здійснює комплексний вплив на організм людини, який проявляється в гальмуванні патологічних гіперпластичних процесів в гормон-залежних органах і тканинах жіночої (молочні залози, ендометрій і шийка матки, яєчники) і чоловічий (передміхурова залоза) репродуктивної системи, пригнічує патологічний зростання і мітоз клітин в органах і тканинах жіночої репродуктивної системи, зменшує розвиток папіломатозу і ступінь дисплазії шийки матки, викликаних вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Властивості

Індол-3-карбінол є біологічно активною речовиною екстракту сімейства хрестоцвітних, блокує гормон-залежні і гормон-незалежні механізми, які активують патологічний клітинний ріст в тканинах молочної залози, матки і передміхурової залози. За рахунок посилення активності ферментів системи цитохрому Р-450, нормалізує баланс естрогенів, пригнічує утворення проканцерогенного 16α-гідроксіестрона і сприяє зсуву співвідношення метаболітів жіночих статевих гормонів - естрогенів на користь освіти 2-С-гідроестрона; попереджає проліферацію клітин у естрогенчутливих тканин; індукує процеси апоптозу в патологічно змінених клітинах; нейтралізує дію ростових факторів, які стимулюють розвиток пухлин в гормонозалежних органах репродуктивної системи; володіє потужним протівірусним ефектом відносно ВПЛ, оскільки блокує синтез проонкогенним білком Е7 в епітеліальних клітинах, інфікованих цим вірусом, викликає вибірккову загибель клітин (апоптоз), заражених ВПЛ, в тому числі і клітин, які вже зазнали вірогенної опухлевої трансформації.

Епігаллокатехін-С-галлат є біологічно активною речовиною екстракту зеленого чаю, активує фагоцитоз, стимулює завершеність фагоцитозу, збільшує число фагоцитуючих клітин, має виражену ангіостатичним дією (пригнічує патологічний ріст нових судин), сприяє зменшенню зростання новоутворень; пригнічує інвазивну активність клітин ендометрія; пригнічує активність ЦОГ-2 і простагландинів. Характеризується здатністю гальмувати ріст судин в міоматозних вузлах, перешкоджає проникненню клітин ендометрія в м'язовий шар матки, тобто є ефективним засобом в боротьбі з аденоміозом.

Показання

Приймати по рекомендації лікаря як додаткове джерело індол-3-карбінолу і епігаллокатехін-3-галлат з метою нормалізації метаболічних процесів в репродуктивних органах жінок і молочних залозах, а також передміхуровій залозі у чоловіків. «Епігалін» може бути рекомендований лікарем при лейоміомі матки, мастопатії, гіперплазії ендометрію, ендометріоз (в тому числі аденоміоз, ендометріюїдних кістах), гіперплазії передміхурової залози при захворюваннях, асоційованих вірусом папіломи людини (дисплазія шийки матки, аногенітальні кондиломи).

Протипоказання

- індивідуальна непереносимість;
- вагітність;
- період лактації.

Запобіжні заходи

Не рекомендується вживати особам, які беруть продукти, що знижують кислотність шлункового соку.

Спосіб застосування та дози

Приймати дорослим по 1-2 капсули в день під час їжі.

Тривалість застосування і необхідність повторного курсу визначає лікар індивідуально.

Зазвичай, тривалість застосування при гіперпроліферативних процесах в репродуктивних органах жінок і передміхуровій залозі у чоловіків становить 6 місяців, а при порушенні метаболічних процесів в молочних залозах і папілломатозе - 3 місяці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4 °С до 25 °С в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 60 капсул в упаковці.

Термін зберігання

2 роки з дати виготовлення.

Виробник

BNI-Biohealth int. GMBH, Німеччина.