Склад

1 капсула містить: сахароміцети Буларді Saccharomyces boulardii (ліофілізовані клітини) 500 mg (мг).

Одна капсула містить не менше 10 х 109 CFU (КУО) сахароміцет Буларді на кінцевий термін придатності.

*Допоміжні речовини***:** антиспікаючий агент тальк. Для желатинової капсули: желатин, вода очищена, барвник титану діоксид, консервант метилпарабен, консервант пропілпарабен.

Характеристика інгрідієнта

Saccharomyces boulardii – пробіотик, який сприяє запобіганню і усуненню симптомів гострої діареї, інтоксикації, а також нормалізації консистенції калових мас, створюють сприятливі умови для відновлення корисної мікрофлори травного тракту.
Має антимікробні, антитоксичні та імуномоделюючі властивості завдяки яким проявляє високу активність проти широкого спектру патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, таких як: Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Salmonella typhi, Escherichia coli, Vibrio cholerae, а також Enthamoeba hystolitica, Lambliae, грибів.
Saccharomyces boulardii можливо застосовувати на фоні антимікробної терапії, оскільки до його складу входять антибіотикорезистентні штами мікроорганізмів.

Рекомендації до споживання

Джерело дріжджів Сахароміцет Буларді, що сприяють покращенню функціонування шлунково-кишкового тракту, нормалізації мікрофлори кишечника та загальному зміцненню організму.

Перед застосуванням потребується консультація з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів, діти до 6 років, вагітність та період годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Для покращення функціонального стану шлунково-кишкового тракту під час прийому антибактеріальних засобів
дорослим - 1 капсула 1-2 рази на день протягом всієї антибіотикотерапії, потім від 3 до 14 днів після антибіотикотерапії.
Дітям старше 6 років 1 капсула 1 раз на день, протягом всієї антибіотикотерапії, потім від 7 до 9 днів після антибіотикотерапії.

Під час подорожей
дорослим - 1 капсула 2 рази на день протягом 5 діб перед подорожжю та під час подорожі.

При зміні режиму харчування та з метою усунення діареї
дорослим 1 капсула 2 рази на день протягом 8-10 діб.

Капсули рекомендується запивати водою.

В подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчування з обмеженням тваринних жирів, солодощів.

Застереження при споживанні

Не можна запивати гарячими напоями та вживати одночасно з алкоголем, щоб не знизити активності Saccharomyces boulardii. Не вживати одночасно з протигрибковими засобами при їх пероральному або комплексному застосуванні. Неприпустимо одночасно приймати пробіотик з ферментними препаратами і антацидами.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °C в оригінальній упаковці виробника.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери у коробці.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія.