

Склад

1 капсула містить

Основні компоненти:

Компонент	1 капсула містить	від рекомендованого рівня добової потреби *
Пірофосфат заліза в ліпосомі (еквівалент заліза 30 мг)	357 мг	177*
Аскорбінова кислота (вітамін С)	70 мг	100**
фолієва кислота	200 мкг	50**
Ціанкобаламін (вітамін В12)	1,75 мкг	60**

* - середнє значення від добової потреби різних статей, без урахування додаткової норми відповідно до фізичної активності, похилого віку, особливого стану (вагітність, годування грудьми).

** - не перевищує верхній допустимий рівень споживання.

допоміжні компоненти: целюлоза мікрокристалічна (Е460), емульгатор, трикальцій фосфат (Е341) в якості антислежуючого агента, кремнію діоксид (Е551), магнію стеарат (Е572), магнію силікат (Е550).

Склад оболонки капсули: желатин, титану діоксид.

Харчова цінність продукту в 100 г: білки -16 г, вуглеводи - 21 г, жири - 6 г.
Енергетична цінність: 824 кДж (197 ккал).

Не містить ГМО.

САНТЕФЕРРА містить пірофосфат заліза в ліпосомі, вітамін С, вітамін В12, фолієву кислоту.

Опис

Капсули САНТЕФЕРРА використовуються як джерело біологічно активних речовин з метою відновлення рівня заліза, вітамінів С, В12, фолієвої кислоти.

САНТЕФЕРРА - дієтична добавка до їжі, являє собою джерело заліза, створена за інноваційною технологією розміщення іона заліза в ліпосомі.

Ліпосоми - це вільні з середини бульбашки, оболонки яких складаються з гідрофобних жирових молекул. Ліпосоми не токсичні, вони проникають через

мембрани клітин для повноцінного засвоєння заліза, яке всмоктується безпосередньо з кишечника, без пошкодження шлунка і слизової кишечника. Ліпосомна технологія дозволяє уникнути побічних ефектів, поширених при прийомі препаратів заліза: печії, подразнення кишечника, розлади стільця (запор, пронос), зміни кольору слизової оболонки рогової порожнини і емалі зубів.

Залізо - це мінерал, необхідний для синтезу гемоглобіна - білка, який міститься всередині червоних кров'яних тілець (еритроцитів) і є основним переносником кисню в усі клітини людського організму. Залізо також присутнє в міоглобіні і дихальних ферментах. Недостатність заліза призводить до розвитку анемії, спричиненої нестачею гемоглобіну і зниженням його вмісту в еритроцитах.

Вітамін С - особливо бажаний антиоксидант, при необхідності збільшення засвоєння заліза і фолієвої кислоти.

Вітамін В12 - це практично незамінний нутрієнт, який потрібен організму для синтезу еритроцитів. Фолієва кислота необхідна для створення і підтримки в здоровому стані нових клітин, тому її наявність особливо важлива в періоди швидкого розвитку організму - на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку і в ранньому дитинстві. Процес реплікації ДНК вимагає участі фолієвої кислоти. Клітини-попередники червоних кров'яних тілець (еритроцитів), які утворюються в кістковому мозку, при дефіциті фолієвої кислоти збільшуються в розмірі, утворюючи так звані мегалобласти.

Показання

У випадках дефіциту заліза:

- при латентному залізодефіциті;
- при хронічних і тривалих крововтратах у жінок під час менструального циклу;
- при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються крововтратою (ерозивний гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, поліпи, геморої і інші);
- при залізодефіцитній анемії на тлі запальних захворювань сполучної тканини і кишечника;
- при вагітності та годуванні груддю, при необхідності профілактики анемії;
- при зменшеному фетоплацентарному кровообігу у вагітних;
- при залізодефіцитних анеміях.

При ознаках дефіциту заліза і дефіциту фолієвої кислоти, таких як:

- стомлюваність;
- погіршення пам'яті;
- спотворення смаку;
- випадання, ламкість волосся;
- ламкість нігтів;
- сухість шкіри;
- гіпо- або антацидність.

Особливості застосування

Можлива індивідуальна непереносимість компонентів продукту.

Не рекомендується застосовувати з іншими дієтичними добавками та препаратами, що містять залізо. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Ефекти від значного перевищення рекомендованих добових доз: можливі тяжкі розлади травлення.

У разі появи небажаних ефектів необхідно припинити вживання і звернутися до лікаря!

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування та дози

Дорослим - по 1 капсулі 1 раз на день під час їжі. Запиваючи достатньою кількістю води. При необхідності і за рекомендацією лікаря - можна застосовувати дітям з 12 років по 1 капсулі 1 раз на добу. Тривалість застосування до 1 місяця.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.