

Склад

1 таблетка містить

Магній (цитрат магнію) - 187,5 мг;

Сухий екстракт з трави меліси (*Melissa officinalis*) - 100 мг;

Сухий екстракт з соєвих бобів (*Glycine max*) стандартизований до 40% вмісту ізофлавонів сої - 50 мг;

Вітамін С (L-аскорбінова кислота) - 40 мг;

Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) - 0,7 мг;

Вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) - 0,55 мг;

допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, картопляний крохмаль, стеарат магнію, двоокис кремнію.

Опис

Клімастоп становить джерело магнію, вітамінів В1, В6 і С а також екстрактів з трави меліси і соєвих бобів. Соеві ізофлавоони регулюють гормональну систему в організмі жінки, діючи у двох напрямках: заміняють жіночі гормони у випадку їх відсутності або навпаки – знижують їх концентрацію, у випадку необхідності.

Меліса діє заспокійливо, сповільнюючи швидке нерегулярне серцебиття, яке спостерігається під час хвилювання і менопаузи. Вітамін В6, який міститься в препараті, сприяє регулюванню гормональної активності. Магній, разом з вітаміном С, сприяє збереженню здоров'я кісток, а тіамін забезпечує правильну роботу серця. Вітамін С бере участь в захисті клітин всього організму від окислювального стресу а також у правильній продукції колагену, з метою забезпечення правильної роботи кровоносних судин. Крім того, компоненти, які містяться в Клімастоп, сприяють зниженню відчуття втоми (магній, вітамін В6 і С), правильній роботі імунної (вітамін В6 і С) і нервової (магній, вітамін В6, С, і тіамін) системи, а також підтримують правильні психологічні функції (магній, тіамін, вітамін В6, В і С).

Клімастоп рекомендується жінкам після 40 років в період менопаузи. Препарат містить натуральні субстанції, важливі для зниження дискомфорту, пов'язаного зі зменшенням рівня жіночого гормону, – естрогену.

Показання

Таблетки Клімастоп рекомендуються в якості дієтичної добавки, як додаткове джерело вітамінів та біологічно активних речовин з метою поліпшення

функціонального стану жінок після 40 років в період менопаузи. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Не рекомендується вживати вагітним та жінкам, які годують груддю, дітям до 18 років, при злоякісних новоутвореннях жіночих репродуктивних органів та молочних залоз, при схильності до маткових кровотеч, а також при індивідуальній чутливості до складових компонентів.

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування та дози

По 2 таблетки на добу після їжі, протягом 1-2 місяців. При необхідності курс можна повторити.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі до 25 °С.

Упаковка

30 таблеток в картонній коробці.

Виробник

PHARMACY Laboratories s.c.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

вул. Віселкі 57, 04-830 Варшава, Польща