

Склад

12 млрд. живих бактерій наступних 10 штамів: *Lactobacillus acidophilus* (La-14), *Lactobacillus rhamnosus* (Lr-32), *Bifidobacterium bifidum* (Bb-02), *Bifidobacterium lactis* (Bl-04), *Bifidobacterium breve* (Bb03), *Lactobacillus paracasei* (Lpc-37), *Lactobacillus plantarum* (Lp-115), *Lactobacillus casei* (Lc-11), *Lactococcus lactis* (Ll-23), *Streptococcus thermophilus* (St-21), вітамін С - 12 мг, фруктоолігосахариди - 5 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (Е 460), магнію стеарат (Е 572), гідроксипропілметилцелюлоза (Е 464), титану діоксид (Е 171).

Опис

Капсули Пролактон можуть бути рекомендовані лікарем в раціонах дієтичного харчування для нормалізації процесу травлення, відновлення балансу нормальної мікрофлори кишечника.

Пролактон містить збалансоване поєднання молочно-кислих бактерій, фруктоолігосахаридів (служать харчуванням для пробіотичних бактерій) і комплексу травних ферментів, контролюючих і підтримують баланс кишкової флори, сприяють поліпшенню травлення, сприяють захисту від патогенних бактерій, підвищенню імунітету і детоксикації.

Завдяки мікрокапсулюванню життєздатність бактерій не порушується при проходженні через верхні відділи шлунково-кишкового тракту, забезпечує стабільне проходження бактерій до місця їх дії - тонкому і товстому кишечнику. Колонізаційна здатність культури посилюється за рахунок комбінації з *Streptococcus thermophilus*.

Застереження

Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання. Не застосовувати при індивідуальній непереносимості до одного або декількох компонентів дієтичної добавки. Рекомендується проконсультуватися з лікарем для детальної інформації вагітним жінкам, жінкам в період годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Вживати дітям старше 3 років по 1 капсулі на добу, дорослим - по 2 капсули на добу, бажано під час прийому їжі. Під час лікування антибіотиками доцільно приймати Пролактон за 2-3 години до або після введення антибіотиків і продовжувати приймати протягом не менше 7 днів після припинення лікування антибіотиком.

Рекомендований термін застосування: тривалість вживання узгоджується з лікарем індивідуально.

Упаковка

15 капсул у блістері, по 2 блістера в упаковці.

Виробник

Actimedix S.R.O., Чехія.