

Склад

Натуральний вітамін Е (268 mg (мг) D-альфа-токоферолу) - 400 МО.

Допоміжні компоненти: D-альфа-токоферол, желатин, соєваолія, гліцерин.

Показання

Может быть рекомендована врачом для использования в рационах диетического питания как источник витаминов, биологически активных веществ с целью общего укрепления организма и создания оптимальных диетологических условий обмена веществ, в частности регуляции витамина Е, который участвует в биосинтезе белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании, других важнейших процессах тканевого метаболизма, предупреждает гемолиз эритроцитов, снижает повышенную проницаемость и ломкость капилляров.

Необходим для развития и функционирования соединительной ткани, гладких и скелетных мышц, а также для укрепления стенок кровеносных сосудов.

При высокой физической нагрузке, нарушении менструального цикла, угрозе прерывания беременности, климактерических вегетативных нарушениях, нарушении функции половых желез у мужчин, неврастении при переутомлении, астеническом синдроме, заболеваниях связочного аппарата и мышц, дерматомиозитах, некоторых дерматозах, псориазе, в геронтологии, при эпилепсии (для повышения эффективности противосудорожных средств), в комплексном применении при многих заболеваниях (как антиоксидант), атрофии зрительного нерва («куриная слепота»).

Противопоказання

- гострий інфаркт міокарда;
- дитячий вік;
- індивідуальна непереносимість продукту або його компонентів.

Спосіб застосування та дози

По 1 капсуле 1 раз в сутки во время или после приема пищи.

Курс применения - 1-2 месяца.

Если продукт назначается врачом, возможно изменение в дозировках.

Не рекомендується назначать в течение длительного времени совместно с другими поливитаминными препаратами, так как возможна передозировка жирорастворимых витаминов Е.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції.

При прийомі великих доз-діарея, болі в епігастрії, креатинурія.

При появі побічних ефектів дозу препарату слід зменшити або скасувати продукт. З обережністю застосовують у хворих на тяжкий кардіосклероз, перенесений інфаркт міокарда, при підвищеному ризику розвитку тромбоемболії; гіпопротромбінемія, спричинена недостатністю вітаміну К, може погіршитися при застосуванні вітаміну Е у дозі понад 400 МЕ.

Також з обережністю застосовувати одночасно з протисудомними засобами у хворих на епілепсію. Підсилює ефект стероїдних і нестероїдних протизапальних засобів, антиоксидантів. Збільшує ефективність і зменшує токсичність серцевих глікозидів, а також вітамінів А і D.

Призначення вітаміну Е у високих дозах може викликати дефіцит вітаміну А в організмі. Одночасне застосування вітаміну Е у дозі понад 400 МО на добу з антикоагулянтами (похідними кумарину та індандіону) підвищує ризик розвитку гіпопротромбінемії та кровотеч. У період вагітності та грудного вигодовування прийом продукту – тільки за рекомендацією лікаря.

Термін придатності

2,5 роки.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 15 капсул в блістері, по 2 блістера в картонній упаковці.

Виробник

Primea Limited.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

20-22 Уэнлок-роуд, Лондон, Англія N1.