Склад

Водно-спиртовий екстракт рослинної сировини: діоскореї кореневища; березового гриба; родіоли холодної кореневища з корінням; капусти брокколі, як джерело індол-3-карбінолу; прутняка звичайного плодів; екстрагент-спирт етиловий 40% і 48%.

Показання

- циклічна масталгія;
- мастодинія (нагрубання і болючість молочних залоз);
- фіброзно-кістозна мастопатія, викликана вираженим підвищенням концентрації пролактину;
- склерополікістоз яєчників;
- кісти яєчників;
- ендометріоз (аденоміоз) міома (фіброміома) матки;
- дисплазія шийки матки.

Протипоказання

Вагітність, період годування груддю, діти до 18 років, підвищена чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

2,5 мл (відповідає 0,5 чайної ложки) приймати 3-4 рази на день до їди, попередньо розвести в 50-100 мл води.

Побічні реакції

При тривалому застосуванні можливі диспепсичні явища: нудота, блювання, рідше-втрата апетиту, пронос; алергічні реакції у вигляді лихоманки, лихоманки, бронхоспазму; сонливість, підвищена стомлюваність. У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°С.

Упаковка

Флакон 100 мл.

Виробник

АТ "Біолік", Україна.