

## Склад

1 капсула містить:

### *Активні інгредієнти:*

Екстракт плодів журавлини великоплідної (300: 1), (*Vaccinium macrocarpon*).

Ліофілізовані пробіотичні молочнокислі бактерії *Lactobacillus acidophilus* SD-5212 (2,5x10<sup>9</sup> КУО).

*допоміжні речовини:* крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, гіпромелоза (оболонка капсули).

## Характеристика

«Фітолізін® Актив» - продукт, який поєднує в складі два компоненти: висококонцентрований екстракт журавлини, що стандартизований за змістом Проантоцианидина і пробіотичні бактерії (*Lactobacillus acidophilus* SD-5212).

«Фітолізін® Актив» застосовують для нормалізації порушень мікрофлори і рН піхви:

- при комплексній терапії бактеріального вагінозу;
- неспецифічних кольпітах (після закінчення прийому курсу антибактеріальної терапії);
- підгострих і хронічних стадіях запальних процесів жіночої статеві системи (після завершення курсу антибактеріальної терапії з метою реабілітації);
- гормонально-залежних кольпітах, в тому числі атрофічних (на фоні специфічної гормональної терапії);
- в складі комплексної терапії рецидивуючих циститів;
- в складі комплексної терапії різних дисбіозів, в тому числі під час і після завершення антибіотикотерапії.

### *Активні речовини*

Проантоціанідини - природні рослинні флавоноїди, демонструють сильні антиоксидантні і антибактеріальними властивості. Сприяють поліпшенню функціонування сечостатевої системи шляхом полегшення елімінації патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів з уrogenітального тракту.

*Lactobacillus acidophilus* - пробіотик, дія якого обумовлена утворенням молочної кислоти, відновлює природно-кисле середовище в піхві. Збільшує стійкість до впливу патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів слизової оболонки сечостатевої системи. Сприяє відновленню мікрофлори шлунково-кишкового

тракту (ШКТ) і уrogenітального тракту при запальних захворюваннях інфекційного і неінфекційного походження. Сприяє нормалізації мікрофлори сечостатевої системи.

Екстракт плодів журавлини - завдяки високому вмісту проантоціанідини має високу протизапальну активність і сприяє виведенню з уrogenетального тракту патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів. Має антиоксидантні і загальнозміцнюючі властивості, які обумовлені вмістом вітаміну С.

### **Рекомендації щодо застосування**

У раціон харчування як додаткове джерело Проантоцианидина і пробіотика *Lactobacillus acidophilus*, при:

- поширенні патогенних бактерій - збудників інфекційних запалень сечовивідних шляхів (цистит) для профілактики і в комплексній терапії;
- під час антибіотикотерапії, і після завершення лікування інфекційних захворювань сечовивідних шляхів з метою нормалізації мікрофлори;
- при сечокам'яній хворобі, в тому числі у вагітних жінок;
- при порушеннях природного балансу мікрофлори сечостатевої системи.

### **Протипоказання**

Не приймати при підвищеній чутливості до компонентів препарату.

#### *Запобіжні заходи*

Продукт не призначений для парентерального застосування.

Не може бути використаний в якості єдиного джерела живлення.

Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

### **Спосіб застосування та дози**

Рекомендоване дозування: дітям від 3-х років і дорослим - по одній капсулі в день під час їжі; вагітним жінкам - по одній капсулі в день під час їжі (або за рекомендацією лікаря).

Термін застосування - 10-25 днів (або за рекомендацією лікаря).

### **Термін придатності**

2 роки від дати випуску.

**Умови зберігання**

Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° С.

**Упаковка**

10 капсул в блістері, 1 блістер в картонній коробці.

**Виробник**

Pileje Industrie Les Tiolans, Франція.