

## **Склад**

*діюча речовина:* кислота саліцилова;

100 мл розчину містять кислоти саліцилової 1 г;

*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

## **Лікарська форма**

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина із запахом спирту.

## **Фармакотерапевтична група**

Дерматологічні засоби. Код ATX D01A E12.

## **Показання**

Застосовують при інфекційних ураженнях шкіри: звичайних вуграх, піодермії.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

*Особливі заходи безпеки.*

Не допускати потрапляння препарату в очі, не наносити на слизові оболонки.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Місцеве застосування саліцилової кислоти не слід поєднувати з пероральним застосуванням препаратів, які містять ацетилсаліцилову кислоту та інші нестероїдні протизапальні засоби. Не застосовувати разом з бензоїл-пероксидом і місцевими ретиноїдами.

Саліцилова кислота може підвищити проникність шкіри для інших лікарських засобів для місцевого застосування і тим самим збільшити їх потрапляння в організм. Крім того, саліцилова кислота може посилити небажану дію метотрексату і гіпоглікемічну дію пероральних протидіабетичних препаратів -

похідних сульфонілсечовини.

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря.

## **Особливості застосування**

Не слід наносити препарат на великі ділянки шкіри.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

Застосовують зовнішньо, змащуючи або розтираючи уражені ділянки шкіри ватним тампоном, просоченим препаратом, 2-3 рази на добу. Курс лікування визначає лікар залежно від перебігу та тяжкості захворювання.

## **Діти**

Не застосовують дітям віком до 12 років.

## **Передозування**

При застосуванні великих доз препарату може посилитися кератолітична дія та алергічні реакції. У такому разі препарат необхідно змити водою, звернутися за консультацією до лікаря. Терапія симптоматична.

## **Побічні реакції**

Можливі зміни з боку шкіри: сухість, лущення, подразнення, контактний дерматит, прояви алергічних реакцій (кропив'янка, свербіж), що потребують відміни препарату.

При тривалому застосуванні можливе всмоктування препарату в загальний кровообіг і розвиток характерних для саліцилатів побічних ефектів: шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, пришвидшене дихання.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

### **Термін придатності**

3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!*

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 40 мл у флаконах.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПРАТ “ФІТОФАРМ”.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).