

Склад

1 г мазі містить сірки 333 мг;

допоміжні речовини: парафін жовтий м'який, емульгатор Т-2, вода очищена.

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь жовтуватого кольору однорідної консистенції.

Фармакотерапевтична група

Препарати для лікування акне. Препарати, що містять сірку.

Код АТХ D10A B02.

Фармакодинаміка

Сірчана мазь проста має протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.

Фармакокінетика

При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Показання

Захворювання шкіри: себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

Протипоказання

Підвищена чутливість до препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

Особливості застосування

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити.

При індивідуальній непереносимості мазі або її компонентів рекомендується припинити застосування даного лікарського засобу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовувати зовнішньо. Мазь наносити на уражені ділянки шкіри 2–3 рази на добу. При лікуванні корости схему застосування препарату і вимоги щодо дотримання правил особистої гігієни визначає лікар індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти

Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років.

Дітям віком від 3 років, застосовувати препарат можна, тільки коли очікувана користь перевищує потенційний ризик.

Передозування

Не спостерігалось.

Побічні реакції

В окремих випадках можливі місцеві реакції підвищеної чутливості.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 г у тубах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).