

Склад

10 мл сиропу містять:

- Азадірахта індійська - 400 мг.
- Сферантус індійський - 400 мг.
- Гемідесмус індійський - 300 мг.
- Червоний сандал - 300 мг.
- Марена серцелиста - 300 мг.
- Сверція чірата - 250 мг.
- Баухинія строката - 200 мг.
- Елефантопус шорсткий - 200 мг.
- Жожоба - 100 мг.

допоміжні речовини: цукор, консервант бензоат натрію.

Лікарська форма

Дієтична добавка. Препарат на трав'яній основі, проявляє функції «очищувача крові».

Показання

- шкірні захворювання: демодекоз, вугри, акне, поодинокі фурункули і фурункульоз, почервоніння і лущення шкіри, атопічний дерматит, екзема, псоріаз;
- гельмінтози, викликані нематодами;
- дисбактеріоз.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Загострення жовчнокам'яної хвороби та запальних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Схильність до кровотеч і діареї, цукровий діабет через високий вміст цукру.

Не слід призначати одночасно з сорбентами.

Особливості застосування

На ряду з лікувальними властивостями в боротьбі з демодекозом, препарат проявляє омолоджуючі, очисні, абсорбуючі, відновлювальні функції, надаючи благотворний вплив на стан шкірного покриву людини, еластичності і молодості.

Основна діюча речовина - азадирахтин, до якого високо чутливі кліщі роду *Demodex*.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітність і в період лактації через відсутність даних клінічних досліджень у цих категорій жінок. Потрібна консультація лікаря.

Спосіб застосування та дози

Дорослим - по одній чайній ложці (5 мл) розвести в склянці води (150 мл), вживати два рази в день за 30 хвилин до їди або 30 хвилин після вживання їжі за рекомендацією лікаря.

Діти від 6-ти років - по 5 мл (одна чайна ложка або підлогу мірного ковпачка) 1-2 рази на добу.

Дорослі та діти віком 12 років 10 мл (2 чайні ложки або один мірний ковпачок) 1-2 рази на добу за рекомендацією лікаря.

Режим дозування і тривалість прийому залежить від тяжкості процесу і визначається лікарем.

Мінімальний рекомендований курс лікування - 30 діб.

Максимальний рекомендований курс лікування - 3 місяці.

Спосіб застосування при демодекозі залежить від клінічної форми:

- еритематозна форма - по 10 мл вранці протягом місяця;
- еритематозно-популезна форма - по 10 мл вранці протягом місяця;
- папульозно-пустульозна форма - по 10 мл вранці та ввечері протягом 2-3 місяців;
- узлова форма - по 10 мл вранці та ввечері протягом 3 місяців.

Побічні реакції

У поодиноких випадках може викликати рідкий стул і здуття живота.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці.

Відкритий флакон зберігати при температурі від + 2 ° С до + 6 ° С.

Упаковка

По 200 мл во флаконе в картонной коробке.

Категорія відпуску

Без рецепта.