Склад

В одному літрі води міститься:

- натрій - 3500-6500 мг;
- калій - 30-40 мг;
- магній - 2000-3000 мг;
- кальцій - 200-1000 мг;
- хлориди - 500-1000 мг;
- сульфати - 17000-22000 мг;
- гідрокарбонати - 500-1100 мг;
- загальна мінералізація - 27500-33000 мг.

Опис

«Хуняді Янош» - лікувальна гірка природна мінеральна вода дуже високої мінералізації з термальних джерел, що знаходяться недалеко від Будапешта (Угорщина).

Особливості

«Хуняді Янош» відрізняється м'якою проносною властивістю і застосовується для зниження ваги та швидкого очищення кишечника від шлаків, токсинів і залишків бактеріальної активності.

Мінеральна вода володіє 100% ефектом для зниження ваги, що є дуже важливим фактором профілактики та лікування судинних захворювань, атеросклерозу, гриж, наслідків інсульту.

«Хуняді Янош» знімає ознаки запальних процесів. Регулярне використання води сприяє очищенню жовчного міхура і призводить до зменшення розвитку каменів.

Застосування даної води після їжі пригнічує зайве всмоктування жирів і білків, що сприяє втраті ваги та знижує ймовірність ожиріння.

«Хуняді Янош» надає дії: проносне (стимулює моторику шлунково-кишкового тракту); жовчогінний; покращує обмін речовин; очищає організм шляхом виведення токсинів, бактерій і солей важких металів; запобігає процесам бродіння і розпаду в товстому кишечнику; перешкоджає всмоктуванню продуктів патологічного розкладання; насичує організм фізіологічно важливими макро- і мікроелементами.

Протипоказання

- виражена серцева недостатність;
- виразкова хвороба шлунка і 12-ти палої кишки в стадії загострення;
- знижена кислотність шлункового соку;
- діарея;
- блювота;
- дефіцит рідини в організмі;
- порушення функції нирок;
- кишкова непрохідність.

Спосіб застосування та дози

Вживається натщесерце.

- при хворобах печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів: 150 мл в теплому вигляді. Якщо секреція підвищена, мінеральну воду рекомендують приймати за півтори години до їжі, якщо кислотність в нормі - за 45-60 хвилин до їжі.
- у випадках, коли хворому протипоказано фізичне напруження (прогресуючі форми атеросклерозу, гіпертонічні захворювання, грижі); патологій прямої кишки (тріщина заднього проходу, гемороїдальні вузли); при хронічних запорах (не для отримання рідкого стільця, а для досягнення щоденної дефекації), хвороби кишечника (синдром подразненого кишечника, дискінезія кишечника): 50-100 мл на день;
- при ожирінні: 100 мл в день;
- для одноразового проносного ефекту: 200 мл;
- при харчових отруєннях, отруєннях солями важких металів і фенолами, а також після курсу глистогінних терапії з метою евакуації вмісту кишечника: 200-400 мл.

Умови зберігання

Зберігати у захищенному від світла місці при температурі від 15 до 25 °C, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 700 мл у пляшці.

Виробник

ТОВ "Медаква", Угорщина.