

Склад

1 таблетка масою 0,25 g(г) містить:

Вітамін D ₃	50,0 µg (мкг) (2000 IU (МО))
Вітамін K ₂ МК-7	50 µg (мкг)

Склад: вітамін D₃ (у формі холекальциферолу); вітамін K₂-7 (у формі менахінона-7, також відомого як МК-7); магнію стеарат; емульгатор тальк; натрію крохмальгліколят; натрію кроскармелоза; кремнію діоксид колоїдний; целюлоза мікрокристалічна; барвник оксид заліза.

Без ГМО.

Рекомендації щодо застосування

Може бути використана в раціонах дієтичного харчування, рекомендованих лікарем, джерело вітаміну D₃ та K₂.

Опис

Вітамін D₃ бере участь у багатьох процесах в організмі. Вітамін D сприяє:

- нормальній абсорбції / засвоєнню кальцію та фосфору,
- підтриманню нормального рівня кальцію в крові,
- підтриманню нормального стану кісток,
- підтриманню нормальної функції м'язів,
- підтриманню нормального стану зубів,
- нормальній роботі імунної системи.

Вітамін D відіграє роль у процесі поділу клітин.

Вітамін K₂ - жиророзчинний вітамін, менахінон-7 - активна форма вітаміну K₂ з високою біодоступністю. Речовина модифікує білки для подальшого зв'язування кальцію крові та впливає на стан стінок судин завдяки сприянню захопленню кальцію кістками. Вітамін K₂ регулює активність білків, необхідних для зміцнення кісткової тканини.

Вітамін K₂ сприяє:

- нормальному згортанню крові;
- підтриманню нормального стану кісток.

Не є лікарським засобом.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці на добу під час або після вживання їжі. Іншу кількість узгоджувати з лікарем.

Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Дієтична добавка не може бути заміною збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.

Тривалість споживання: 30 днів. В подальшому можливість повтору узгоджувати з лікарем.

Застереження

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, діти до 18 років, вагітні та жінки в період лактації.

Не рекомендується споживати продукт у разі високого рівня кальцію в крові або сечі, або у випадку каменів у нирках.

Форма випуску

50 таблеток, в блістерах по 10 штук , в картонній упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Зберігати в захищеному від вологи місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Виробник

Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів): ТОВ «АТІС ФАРМА» 03022, м. Київ, вул. Козацька, буд. 122, оф. 100

Найменування та місцезнаходження виробника: «Supravitz Lifesciences Pvt. Ltd.», 103 & 104 Kamala Amrut Industrial Park nr. Torrent Pharma, At-Indrad, Ta-Kadi, Mahesana (Gujarat) - 382715, India (Індія)