

## **Склад**

*діючі речовини:* йод, калію йодид;

1 г розчину містить йоду 10 мг, калію йодиду 20 мг;

*допоміжні речовини:* гліцерин, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Розчин.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора сиропоподібна рідина червонувато-бурого кольору із запахом йоду.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

Люголя розчин чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

## **Показання**

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок, виражена гіперфункція щитовидної залози, декомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні перед та після дослідження або терапії).

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

### **Особливості щодо застосування**

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат. Не допускати потрапляння препарату в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму; при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу – це може зашкодити здоров'ю.

*Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.*

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не виявлена.*

### **Спосіб застосування та дози**

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим у препараті, змащувати уражені слизові оболонки глотки та гортані 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

*Діти* Не застосовувати дітям до 5 років.

### **Передозування**

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слиновиділення, висипання, м'язова слабкість, загальмованість).

*Лікування.* негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

### **Побічні ефекти**

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

**Термін придатності**

3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 25 г у флаконах або по 25 г у флаконі в пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».