

## **Склад**

*діюча речовина:*

1 г гранул містить *Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K*-0,01 мл;

*допоміжні речовини:* сахароза, лактози моногідрат.

## **Лікарська форма**

Гранули дозовані.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білі або практично білі округлі гранули, легко розчиняються у воді.

## **Фармакотерапевтична група**

Гомеопатичний препарат.

## **Фармакотерапевтична група**

Гомеопатичний препарат.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.* Фармакологічні властивості лікарського засобу зумовлені дією його компонентів. Засіб регулює захисні реакції організму.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

## **Показання**

Симптоматичне лікування та профілактика грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій, що проявляються пропасницею, ознобом, ломотою в тілі та головним болем.

## **Протипоказання**

- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахаразо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа або глюкозо-галактозна мальабсорбція.

## **Особливості щодо застосування**

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж приймати Оциллококцінум®. Цей лікарський засіб не замінює сезонної вакцинації проти грипу.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Оскільки безпека застосування Оциллококцінуму® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не виявлено.

## **Спосіб застосування та дози**

Для перорального застосування.

*Дорослі та діти*

Прийняти 1 дозу якомога раніше після появи перших симптомів захворювання. Повторити 2 рази з інтервалом у 6 годин. Приймати протягом 1-3 днів.



Пенал із гранулами витягнути  
із упаковки



Відкрити пенал, відкрутивши  
кришечку



Вміст пенала перемісти  
язик , тримати у роті  
повного розчинення

*Діти.* У разі застосування дітям віком від 2 до 6 років гранули рекомендується розчинити у невеликій кількості води.

## **Діти**

Оциллококцінум® можна застосовувати дітям віком від 2 років.

## **Передозування**

Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялося.

## **Побічні ефекти**

В осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливі прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипи, свербіж.

### **Термін придатності**

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

### **Упаковка**

Гранули дозовані по 1 г у поліпропіленовому пеналі з поліетиленовою кришечкою. По 6 пеналів у картонній коробці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

БУАРОН/BOIRON