

Склад

діюча речовина:

1 г гранул містить *Anas barbariae, hepatis et cordis extractum* 200К-0,01 мл;

допоміжні речовини: сахароза, лактози моногідрат.

Лікарська форма

Гранули дозовані.

Основні фізико-хімічні властивості: білі або практично білі округлі гранули, легко розчиняються у воді.

Фармакотерапевтична група

Гомеопатичний препарат.

Фармакотерапевтична група

Гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості лікарського засобу зумовлені дією його компонентів. Засіб регулює захисні реакції організму.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання

Симптоматичне лікування та профілактика грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій, що проявляються пропасницею, ознобом, ломотою в тілі та головним болем.

Протипоказання

- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа або глюкозо-галактозна мальабсорбція.

Особливості щодо застосування

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати Оцилококцінум[®]. Цей лікарський засіб не замінює сезонної вакцинації проти грипу.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки безпека застосування Оцилококцінуму[®] у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не виявлено.

Спосіб застосування та дози

Для перорального застосування.

Дорослі та діти

Прийняти 1 дозу якомога раніше після появи перших симптомів захворювання. Повторити 2 рази з інтервалом у 6 годин. Приймати протягом 1-3 днів.



Пенал із гранулами витягнути із упаковки



Відкрити пенал, відкрутивши кришечку



Вміст пенала перемістити язик, тримати у роті повного розчинення

Діти. У разі застосування дітям віком від 2 до 6 років гранули рекомендується розчинити у невеликій кількості води.

Діти

Оцилококцінум[®] можна застосовувати дітям віком від 2 років.

Передозування

Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялося.

Побічні ефекти

В осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливі прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипи, свербіж.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

Упаковка

Гранули дозовані по 1 г у поліпропіленовому пеналі з поліетиленовою кришечкою. По 6 пеналів у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

БУАРОН/BOIRON