

## **Склад**

Активні компоненти	гомогенізована суміш екстрактів чаги (чорний березовий гриб), цмину піскового, щавлю кінського, звіробою звичайного, золототисячника звичайного, календули аптечної, калини звичайної, солодки голої, споришу, хвоща польового, ехінацеї пурпурової, часнику, глоду колючого, шипшини коричного, суници лісової, шавлії, барвінку малого, лопуха великого, піона, смородини чорної, аїру болотного
Допоміжні компоненти	етанол 40%

## **Опис**

Застосування Вітокана сприяє:

- зміненню рівня пролактину, нормалізації рівня гормонів гіпофіза і статевих гормонів естрадіолу і прогестерону у жінок.
- зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів.
- стимуляції роботи шлунково-кишкового тракту, жовчогінній і спазмолітичній ефектів, надає м'яку заспокійливу дію, сприяє зменшенню нервового збудження, поліпшенню сну, підвищенню працездатності.
- нормалізації функції ендокринної системи і поліпшення якості життя в період перименопаузи і постменопаузи.

Біологічно активні речовини екстрактів лікарських рослин, що входять до складу Вітокана, мають протизапальні, анальгезируючі і мембрально-стабілізуючі ефекти. Надає м'яку заспокійливу дію, сприяє зменшенню нервового збудження, поліпшенню сну, підвищенню працездатності, сприяє підвищенню імунної відповіді

## **Показання до використання**

Вітокан рекомендується застосовувати в комплексній терапії при:

- фіброзно-кістозної мастопатії;
- клімактеричному синдромі;
- хіургічної менопаузі;
- передменструальний синдром;
- дисгормональних розладах в період перименопаузи і постменопаузи.

## **Спосіб застосування**

Приймати по 30 крапель (1 ml), за 15-30 хвилин до їжі, запиваючи теплою водою, 3 рази в день (вранці, вдень і ввечері).

Курс прийому: 1 місяць, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікуючим лікарем.

## **Протипоказання**

Досвіду застосування для дітей до 12 років є, підвищена чутливість до компонентів препарату, виражені порушення функції печінки і нирок, годування грудьми.

## **Побічні ефекти**

Рідкісні алергічні реакції при індивідуальній чутливості до будь-якого компонента.

## **Умови зберігання**

При температурі 2C ° 25C °, 24 місяці.