

Склад

діючі речовини: 1 г мазі містить терпентину модрина — 54 мг, олії терпентинової — 72 мг, олії евкалиптової — 12 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, віск жовтий, кислота стеаринова, кислота олеїнова, полісорбат 20, олія розмаринова, олія чебрецева, мідний комплекс хлорофілів (E 141), тимол.

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: світло-зеленого кольору, прозора, однорідна мазь з характерним запахом ефірних олій і терпентинової олії.

Фармакотерапевтична група

Інші антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Ілон® Класік є рослинним лікарським препаратом, який сприяє кровопостачанню ураженої ділянки шкіри, знімає запалення і чинить дезінфікуючу дію. Мазь сприяє дозріванню та прориванню абсцесу, при цьому гній повністю витягується, що запобігає капсуляції гнійних середовищ запалення, які не повністю спорожнені.

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні дослідження не проводилися.

Показання

Лікування помірних, локалізованих гнійних запалень шкіри, таких як абсцеси, фурункули, гнійні вузлики, запалення волосяних фолікулів і потових залоз.

Протипоказання

Підвищена чутливість до ефірних олій або до будь-яких інших компонентів лікарського засобу.

Протипоказано застосовувати дітям із судомами в анамнезі (які можуть бути пов'язані або не пов'язані з лихоманкою).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

До цього часу не було повідомлень про будь-які взаємодії.

Особливості щодо застосування

Лікарський засіб містить бутилгідрокситолуол (Е 321). Тому слід мати на увазі, що препарат може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.

При використанні мазі Ілон[®] Класік слід переконатися, що мазь не потрапить в очі або близько очей. Руки повинні бути ретельно вимиті після використання мазі.

Застосування мазі повинно бути обмежене показаннями. Не застосовувати мазь Ілон[®] Класік для лікування свіжих ран і висипів на шкірі.

У разі погіршення шкірного запалення (збільшення ділянки почервоніння, набряк, біль) або загального стану (лихоманка), або якщо не відбулося ніякого поліпшення, пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Ілон[®] Класік не рекомендовано застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки дослідження впливу лікарського засобу на репродуктивну систему, перебіг вагітності і стан плода/дитини не проводилися.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не виявлено.

Спосіб застосування та дози

Лікарський засіб для місцевого застосування.

Ретельно очистити ділянку запалення спиртом або іншим дезінфекційним засобом перед застосуванням. Уникайте будь-якого тиску на уражену ділянку шкіри. Залежно від площі запалення шкіри, нанести смужку мазі, довжиною 2–3 см, і накрити рану пов'язкою. Пов'язку слід міняти щодня.

Дітям віком до 6 років не рекомендується застосовувати мазь Ілон[®] Класік.

Тривалість використання.

Для успішного результату лікування може потребуватися застосування мазі Ілон[®] Класік принаймні 3 дні. Якщо симптоми зберігаються довше 3 днів під час застосування лікарського засобу, слід звернутися до лікаря.

Діти.

Для дітей віком від 6 років.

Передозування

Повідомлень щодо передозування лікарського засобу не надходило.

Побічні ефекти

У рідкісних випадках можливі алергічні реакції (свербіж, набряк, почервоніння шкіри, висип, відчуття печіння), які минають після припинення застосування лікарського засобу Ілон[®] Класік, мазь.

У разі появи будь-яких побічних ефектів пацієнт повинен звернутися до лікаря.

Повідомлення про підозру на побічні реакції

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їхнім законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua/>.

Термін придатності

3 роки.

Термін придатності після першого відкриття — 6 місяців.

Умови зберігання

Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 г, по 50 г, по 100 г мазі у тубі. По 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Цесра Арцнайміттель ГмбХ і Ко. КГ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Браунматтштрассе 20, 76532 Баден-Баден, Німеччина.