

## **Склад**

*діюча речовина:* йод;

100 мл розчину містять йоду 5 г;

*допоміжні речовини:* калію йодид, етанол 96 %, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина червоно-бурого кольору, прозора у тонкому шарі, з характерним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A G03.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

Лікарський засіб містить елементарний йод, для якого характерні протимікробна, місцевоподразнювальна та відволікаюча дії. При нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму. Проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

## **Показання**

Застосовують зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікаючу дію).

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до йоду. Також препарат протипоказаний при діабетичних, трофічних виразках.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, може спостерігатися денатурація білкових компонентів.

Несумісний з ефірними оліями, розчином аміаку, брильянтовим зеленим.  
Несумісний з дезінфекційними лікарськими засобами, що містять ферменти, ртуть, луги, відновники.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

### **Особливості щодо застосування**

Слід бути обережними при застосуванні йоду на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Не допускати потрапляння препарату в очі. Слід бути особливо обережними при застосуванні йоду пацієнтам зі світлим волоссям.

Не слід застосовувати на великі ділянки шкіри через можливий розвиток опіку.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу це може зашкодити здоров'ю.*

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Не рекомендується застосування препарату у період вагітності та годування груддю через ризик розвитку порушень функції щитовидної залози у плода/дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### **Спосіб застосування та дози**

При зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

*Діти.*

Не застосовувати новонародженим через ризик розвитку порушень функції щитовидної залози та уражень шкіри.

### **Передозування**

При передозуванні можливі явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъозотеча, слинотеча, вугрові висипи на шкірі), опіки, подразнення шкіри.

Терапія симптоматична.

### **Побічні ефекти**

Можлива поява нежитю, кропив'янки, набряку Квінке, слино- та слъозотечі, висипів на шкірі, контактного дерматиту.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

### **Термін придатності**

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 20 мл у флаконах.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».