

Склад

Стіки №30 по 2500 мг.

Активні речовини:

- 2000 мг міо-інозитулу;
- 48 мг банаба (*Lagerstroemia Speciosa*, листя), титр. екстракт 1% коросолієвої кислоти;
- 1000 МО вітаміну D3;
- 400 мкг Метилфолат-Кватрафолік;
- 40 мкг хрому.

Без глютену. Не містить ГМО.

Властивості

Міохіп Ого дієтична добавка на основі активно-діючих речовин міо-інозитулу, екстракту банаба, вітаміну D3, фолієвої кислоти і хрому, може бути корисною в якості допоміжних речовин в лікуванні безпліддя при синдромі полікістозних яєчників. Комбінований препарат Міохіп Ого може бути рекомендований лікарем, як додаткове джерело до раціону харчування міо-інозитола-2000мг, метилфолату-400мкг, вітаміну Д-1000МО, Хрому-40мкг і екстракту банаба-48мг (коросолієвої кислоти).

Активні речовини Міохіп Ого можуть сприяти:

- Сприяють відновленню менструальної циклічності у пацієток з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) з оліго-/ аменореєю, відновленню овуляції.
- Підвищенню чутливості до інсуліну при інсулінорезистентності (ІР), при гіперандрогенії (гірсутизмі) знижуючи рівень загального і вільного тестостерону в крові, сприяють покращенню шкірних проблем, таких як акне, себорея, надмірний ріст волосся на тілі й обличчі).
- Покращують ядерно-цитоплазматичне дозрівання ооцитів, завдяки покращенню фолікулярного середовища, виходу дозрілих форм ооцитів; покращують якість ооцитів і збільшують кількість ембріонів високої якості.
- Можуть покращувати результати ДРТ у жінок з СПКЯ.

Рекомендації щодо застосування

- При ановуляторному безплідді жінок з СПКЯ;
- При недозрілості ооцитів;

- При відсутності овуляцій;
- При тяжких формах інсулінорезистентності (ІР) у жінок з СПКЯ;
- При гіперанδροгенії (гірсутизмі), дисменореї (оліго-/ аменореї);
- При низькій якості ооцитів і як наслідок низькій якості ембріонів;
- При полікістозно-змінених яєчниках;
- Профілактика синдрому передчасного виснаження яєчників;
- Для первинної профілактики гестаційного цукрового діабету у пацієнток з СПКЯ;
- Для профілактики макросомії при СПКЯ.

Спосіб застосування та дози

Рекомендується приймати жінкам 1-2 пакетика на добу, який необхідно розчинити в склянці води. Рекомендований курс прийому від 3 до 6 місяців, індивідуально встановлює лікар. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компоненту Mioxin Oro.

Особливості щодо застосування

Проконсультуйтеся з лікарем перед початком застосуванням Mioxin Oro.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, сухому прохолодному місці, недоступному для дітей, при температурі не вище 30 ° С.