

Склад

На 1 таблетку (800 mg (мг)): *активні інгредієнти:* вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти) – 50 mg (мг), цинку гліцинат – 15 mg (мг), вітамін В₂ (рибофлавін) – 1,5 mg (мг), вітамін В₆ – (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 1,5 mg (мг), вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферилацетату) – 3 mg (мг), вітамін D₃ (холекальциферол) – 400 IU (МО) (10 µg (мкг)); *допоміжні речовини (таблетки з вишневим смаком):* натуральний фруктовий сік: вишневий; глюкоза (декстроза), інулін, мальтодекстрин, підкислювач: магнію цитрат; крохмаль кукурудзяний, антикомкувач: кальцію стеарат. *допоміжні речовини (таблетки з чорничним смаком):* натуральний фруктовий сік: чорничний; глюкоза (декстроза), інулін, мальтодекстрин, підкислювач: магнію цитрат; крохмаль кукурудзяний, антикомкувач: кальцію стеарат. *допоміжні речовини (таблетки з апельсиновим смаком):* натуральний фруктовий сік: апельсиновий; глюкоза (декстроза), інулін, мальтодекстрин, підкислювач: магнію цитрат, крохмаль кукурудзяний, антикомкувач: кальцію стеарат, барвник: β-каротин.

Властивості

Цинк – важливий мікроелемент для імунної системи та організму в цілому. Цинк є кофактором для синтезу білків протівірусного захисту організму людини, регулює проліферацію, диференціювання, функціонування клітин імунної системи.

Deflu® Defence Zinc tablets/Дефлю® Захист Цинк таблетки містять цинку гліцинат – хелатну сполуку цинку і амінокислоти гліцину. Хелатні форми цинку краще засвоюються в кишечнику, навіть при станах, коли засвоєння цинку порушено.

Вітамін D₃ впливає на активність клітин імунної системи, бере участь у функціонуванні вродженого та набутого імунітету, сприяє усуненню запального процесу. Дефіцит вітаміну D₃ відноситься до факторів ризику розвитку гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Можливість профілактичного застосування вітаміну D₃ в сезон ГРВІ та грипу пов'язують зі стимулюванням синтезу антимікробних білків, що здатні руйнувати мікробні патогени, включаючи віруси.

Вітамін С є антиоксидантом. Під час захворювання, в умовах підвищеного окислювального стресу достатня концентрація вітаміну С – необхідна умова для боротьби імунної системи з вірусами та бактеріями. Дефіцит цинку, вітамінів D₃, С, Е, групи В є однією з частих причин дисфункції імунної системи. Достатня

концентрація вітамінів D₃, С, Е, групи В має важливе значення для підтримки імунітету, формування повноцінної та адекватної імунної відповіді.

Рекомендації щодо застосування

Рекомендується в якості добавки дієтичної до раціону харчування як додаткове джерело цинку та вітамінів з метою підтримки протівірусного імунітету у дітей та дорослих. Сприяє підвищенню опірності організму до вірусів та бактерій, забезпечує підтримку імунної системи під час сезонних застудних захворювань. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати дітям віком від 3 до 12 років по 1 таблетці на добу, дорослим 1-2 таблетки на добу для полегшення перебігу гострих вірусних інфекцій у сезон застудних захворювань, посилення опірності організму та покращення імунної відповіді.

За рекомендацією лікаря можливе застосування Deflu® Defence Zinc tablets/Дефлю® Захист Цинк таблетки по 1 таблетці кожні 2-3 години протягом 3 днів, максимальна добова доза 6 таблеток для дітей та дорослих. Таблетку потрібно розсмоктувати або розжовувати.

Краще таблетку приймати в перервах між їжею, при виникненні дискомфорту у шлунково-кишковому тракті Deflu® Defence Zinc tablets/Дефлю® Захист Цинк таблетки слід приймати безпосередньо до або під час їди.

Для полегшення перебігу гострих вірусних інфекцій у сезон застудних захворювань, посилення опірності організму та покращення імунної відповіді у сезон застудних захворювань рекомендований курс 1 місяць з перервою в 1 місяць, далі можливе повторення курсу протягом усього сезону підвищеної захворюваності, якщо лікар не призначив інакше.

Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання. Слід уникати одночасного вживання з препаратами, що містять вітаміни та/або цинк. При необхідності комплексного прийому обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Застереження

Цинк у складі Deflu® Defence Zinc tablets/Дефлю® Захист Цинк таблетки може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту у вигляді неприємного присмаку у роті, нудоти.

Для зменшення неприємного відчуття таблетки слід приймати безпосередньо до або під час їди. Не слід використовувати Deflu® Defence Zinc tablets/Дефлю® Захист Цинк таблетки одночасно з молочними продуктами. Можлива підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів, вітамінів та/ або мінералів рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

- Діти віком до 3 років;
- вагітність та період лактації;
- гострі запалення нирок;
- індивідуальна непереносимість компонентів;
- порушення функцій шлунково-кишкового тракту;
- діабет I типу, непереносимість певних цукрів.

Дієтична добавка Deflu® Defence Zinc tablets/Дефлю® Захист Цинк таблетки.

Форма випуску

Жувальні таблетки № 30, по 3 блістери в упаковці (по 10 таблеток в блістері з однаковим смаком: вишневим, чорничним та апельсиновим). Маса 1 таблетки: 800 mg (мг) ± 5 %

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5°C до 25 °C в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки.

Виробник

ПП «Чарлі», Україна, 61064, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, для ТОВ «Дельта Медікел», Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола.