

Склад

Крохмаль алюміній октен сукцинат, гексаметилдісілоксан, масло солодкого мигдалю, вітамін Е-ацетат, ксіменінова кислота, ефірна олія лимона, ефірне масло чайного дерева, натрієва сіль гіалуронової кислоти, бутан, ізобутан, пропан.

Показання

Спрей для зовнішнього застосування Cicatridina рекомендується як допоміжна терапія для посилення репаративних процесів поверхневих і глибоких ран (саден, порізів, опіків, хірургічних ран, пролежнів і виразок).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування

Перед кожним застосуванням ретельно очистити оброблювану ділянку. Перед кожним застосуванням для кращого перемішування порошку добре струсіть ємність, поки не почуєте звук кульки всередині флакона. Під час розпилювання виробу, тримайте флакон вертикально на відстані 10-15 см і стежте, щоб виріб розпорошувався безпосередньо на оброблювану ділянку. Повторіть 2 або 3 рази на день.

Побічні реакції

Використання виробів для місцевого застосування, особливо тривале, може привести до сенсibiliзації. Якщо це трапляється або в разі виникнення будь-яких інших побічних ефектів, припиніть лікування і зверніться до лікаря для проходження відповідної терапії.

Умови зберігання

Увага! Легкозаймистий аерозоль. Ємність під тиском: при нагріванні може вибухнути.

Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел займання. Не курити. Не розпиляти на відкритий вогонь або інші джерела загоряння. Не протикати та не спалювати навіть після використання. Зберігати в захищеному від сонячних променів місці. Зберігати при температурі

не вище 50 °C/122 ° F. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі.

Упаковка

По 125 мл в флаконі.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

FARMA-DERMA S.R.L., Італія.