

## **Склад**

*діюча речовина:* цинку оксид;

1 г мазі містить цинку оксиду 0,1 г;

*допоміжна речовина:* парафін білий м'який.

## **Лікарська форма**

Мазь 10 %.

*Основні фізико-хімічні властивості:* мазь білого або білого з жовтим відтінком кольору. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати з пом'якшувальною і захисною дією.

Код АТХ D02A B.

## **Фармакодинаміка**

“Цинкова мазь” чинить в'яжучу, адсорбуючу, антисептичну дію, зменшує виразність ексудативних процесів.

При місцевому застосуванні зменшує прояви запалення та подразнення шкіри, пом'якшує та підсушує її.

## **Фармакокінетика**

При зовнішньому застосуванні “Цинкова мазь” практично не адсорбується у системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

## **Показання**

Лікування і профілактика пелюшкового дерматиту. Лікування дерматитів, екземи, попріlostей, ушкоджень шкіри (невеликі термічні і сонячні опіки, порізи, подряпини).

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Гнійно-запальні захворювання шкіри та прилеглих тканин.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Взаємодія не встановлена.

### **Особливості застосування**

Мазь призначена тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати при гнійничкових хворобах шкіри.

Мазь наносити тільки на неінфіковані ділянки шкіри.

Не допускати попадання мазі на слизові оболонки та в очі. У разі попадання мазі в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.

Якщо пелюшковий висип у дитини не зникає протягом 7 днів від початку застосування препарату, необхідно припинити лікування і звернутися за повторною консультацією до лікаря.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

#### *Пелюшковий дерматит у дітей*

З метою профілактики мазь наносити на чисту та суху шкіру (під пелюшки), особливо перед сном, для запобігання виникненню подразнення шкіри через тривалий контакт з мокрими пелюшками.

З лікувальною метою мазь наносити на шкіру тонким шаром тричі на добу (у разі необхідності – під час кожної зміни пелюшок) при появі перших ознак гіперемії (почервоніння шкіри), попрілості або незначного подразнення шкіри.

*Дерматити, екзема, термічні та сонячні опіки, порізи, подряпини, попрілості*

Мазь наносити тонким шаром на уражену поверхню. У разі необхідності накладати марлеву пов'язку.

Термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

## **Діти**

Препарат можна застосовувати у педіатричній практиці.

## **Передозування**

При місцевому застосуванні передозування малоімовірне. При випадковому прийомі внутрішньо у великих дозах можуть виникати біль у шлунку, нудота, блювання, діарея, стимуляція центральної нервової системи і судоми.

## **Побічні реакції**

Реакції підвищеної чутливості до препарату, включаючи свербіж, гіперемію, висипання; зміни у місці нанесення мазі, лущення, біль, кропив'янка. При тривалому застосуванні можливе подразнення шкіри.

## **Термін придатності**

5 років.

## **Умови зберігання**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 20 г у тубах.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).