

## **Склад**

1 таблетка, покрита кишково-розчинною оболонкою, містить серратіопептидазу 10 мг (мг).

## **Опис**

Серратіопептидаза – протеолітичний фермент, одержаний з ентеробактерій *Serratia marcescences*. Виявляє протизапальну, імуномодулюючу, фібринолітичну, протинабрякову та антиагрегантну дії. Використання серратіопептидази має багаторічну успішну історію у Японії та країнах Європи.

ФОРТІНАЗА випускається у спеціальних таблетках, покритих кишковорозчинною оболонкою, яка не допускає контакту серратіопептидази з агресивним середовищем шлунка та доставляє фермент безпосередньо до тонкого кишечника.

## **Рекомендації щодо застосування**

Дієтична добавка може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування дітям від 12 років та дорослим як джерело високоактивного протеолітичного ферменту – серратіопептидази – при широкому спектрі патологій, в основі яких лежить запалення.

Рекомендується дотримуватися збалансованого раціону харчування, обмежувати цукор, сіль, солодоці, алкоголь.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

## **Спосіб застосування**

Дітям старше 12 років та дорослим вживати по 1 таблетці 2 рази на день після їди. Таблетку слід ковтати, не розжовуючи, і запивати однією склянкою води. Максимальна добова доза, що рекомендується, – 30 мг. Доза та тривалість курсу прийому визначаються у кожному випадку індивідуально лікарем.

## **Застереження**

Не приймати при гіперчутливості (алергії) до діючих речовин або до будь-якого іншого компонента продукту. Порушення зсідання крові.

Не перевищувати вказану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Перед застосуванням рекомендовано консультацію лікаря.

**Вагітність та годування груддю.** Проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням препарату.

**Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.**