

Склад

діюча речовина: сірка;

1 г мазі містить 0,33 г сірки;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т2.

Лікарська форма

Мазь 33,3 %.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь жовтуватого кольору.

Фармакотерапевтична група

Дерматологічні засоби. Місцеві протипаразитарні, протимікробні засоби. Препарати, що містять сірку. Код АТХ D10A B02.

Фармакодинаміка

Сірчана мазь проста має протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.

Фармакокінетика

При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та парафін білий м'який, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Показання

Захворювання шкіри – себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

Протипоказання

Підвищена чутливість до препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

Особливості застосування

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами не описаний.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Безпеку та клінічну ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчали, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Спосіб застосування та дози

Сірчану мазь просту застосовувати зовнішньо. Мазь наносити на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схема застосування препарату та вимоги щодо дотримання правил особистої гігієни визначає індивідуально лікар.

Діти

Протипоказано дітям віком до 3 років. Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

Передозування

Не спостерігалось.

Побічні реакції

Алергічні реакції.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 г у контейнерах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).