

## **Склад**

*діюча речовина:* сірка;

1 г мазі містить сірки для зовнішнього застосування 333 мг;

*допоміжні речовини:* емульсія консистентна: вода очищена, парафін білий м'який, емульгатор «Т-2», олія мінеральна.

## **Лікарська форма**

Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* густа однорідна маса жовтуватого із зеленуватим відтінком кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Дерматологічні засоби. Препарати для лікування акне. Код АТХ D10A B02.

## **Фармакодинаміка**

При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.

## **Фармакокінетика**

При зовнішньому застосуванні Сірчаної мазі простої сірка та парафін білий м'який, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

## **Показання**

Захворювання шкіри: себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

### **Особливості застосування**

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат застосовують зовнішньо.

Мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схему застосування препарату і вимоги до особистої гігієни визначають індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

### **Діти**

Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років.

Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат можна тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

### **Передозування**

Не спостерігалось.

**Побічні реакції**

Алергічні реакції.

**Термін придатності**

2 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

25 г у банці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).