

Склад

1 таблетка: *содержит активные ингредиенты:* рутин - 100,0 mg (мг), бромелаин - 2000000 IU (МО), трипсин - 70000 IU (МО); *вспомогательные вещества:* разрыхлители: микрокристаллическая целлюлоза, поливинилполипиролidon; загуститель: поливинилпирролидон; наполнители: тальк, стеарат магния; антислеживающий агент: диоксид кремния; эмульгатор: гидроксипропилметилцеллюлоза; наполнитель: триацетин; глазирующий агент: метилакрилова кислота стабилизатор: триэтилцитрат; красители: диоксид титана, индиго, оксиды железа.

Без ГМО.

Властивості

Комплекс ензимів та рутину для сприяння зменшенню набряку та запалення.

Рекомендації щодо застосування

Рекомендовано як дієтична добавка до раціону харчування з вмістом протеолітичних ензимів – трипсину, бромелаїну і флавоноїду – рутину для сприяння зменшенню набряків і запалень різного походження (запальні зміни опорно-рухового апарату, сечо-статевих органів, органів черевної порожнини, ротової порожнини, дихальних шляхів, після травм і оперативних втручань).

ЕНЗІБАР ТІБІАР сприяє очищенню рани від некротичних тканин, покращенню мікроциркуляції, зменшенню проникності капілярів, що, в свою чергу, сприяє зменшенню венозного застою та прискоренню процесів відновлення та загоєння.

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1 таблетці 1-2 рази на добу за 30 хвилин до їди, не розжовуючи і запиваючи великою кількістю рідини (100-200 ml (мл)). Курс та термін споживання визначає лікар індивідуально. Доза може бути збільшена лікарем.

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) дієтичної добавки: на 100 г (г): білки – 20,46 г (г), вуглеводи – 40,92 г (г), жири – 0,76 г (г); 1028,13 kJ (кДж)/245,52 kcal (ккал); **на 1 таблетку:** білки – 0,08 г (г), вуглеводи – 0,16 г (г), жири – 0,003 г (г); 4,02 kJ (кДж)/0,96 kcal (ккал).

Застереження

Дотримуватись обережності при одночасному застосуванні з антитромботичними засобами за рахунок потенціювання їх дії. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед початком прийому рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окремих компонентів дієтичної добавки. Дозволений до вживання з 18-ти років, не застосовувати дітям.

Форма випуску

Маса нетто 1 таблетки: 416 mg (мг) $\pm$ 5 %.

Форма випуску: таблетки №10 у стріпах 1x10 у картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у сухому і недоступному для дітей місці.

Термін придатності

2 роки.