

## **Опис**

Антиперспірант Etiaxil Confort Plus – ефективний роликівий антиперспірант нічної дії для чутливої шкіри, який забезпечує тривалий захист від помірною потовиділення та запаху поту в області пахв. Засіб підходить також і людям із нормальним типом шкіри. Не містить спирту. Має м'який вплив на шкіру завдяки новій системі догляду за шкірою. Збагачений натуральними пом'якшувачими речовинами для максимального комфорту чутливої шкіри. Одне нанесення на ніч забезпечує захист від поту та запаху до 3 днів, антиперспірант зберігає свій ефект незалежно від щоденних водних процедур. Користуватися Etiaxil Confort Plus достатньо 1 або 2 рази на тиждень або рідше, залежно від ступеня потовиділення. Одного флакону вистачає на 4-6 місяців.

## **Особливості застосування**

Антиперспіранти Etiaxil наносяться в область пахвових западин лише на ніч, оскільки вночі потові залози менш активні. Не слід застосовувати Etiaxil вранці або протягом денного часу;

Заборонено наносити Etiaxil на подразнену або пошкоджену шкіру. Не можна використовувати антиперспірант відразу після депіляції (застосування можливе мінімум через 48 годин) а також не можна робити депіляцію менше ніж за 48 годин до повторного нанесення Etiaxil на ніч, інакше може відчуватися некомфортне свербіння або печіння. Найбільш зручною схемою застосування Etiaxil є нанесення його увечері, а здійснення депіляції – на ранок наступного дня;

Перед застосуванням антиперспірантів від поту Etiaxil необхідно промити пахви прохолодною водою з милом і ретельно витерти їх насухо. Можна висушити шкіру феном. Не можна наносити Etiaxil на вологі або напіввологі пахви.

## **Спосіб застосування**

Etiaxil наноситься по центру сухих неподразнених пахв двома-трьома рухами роликівого антиперспіранта вгору-вниз. Після нанесення Etiaxil дайте йому висохнути 3-4 хвилини або скористайтеся феном. До ранку області нанесення засобу від поту не повинні контактувати з водою;

Вранці помийте пахви водою з милом.

Описана процедура нанесення засобів від поту Etiaxil повторюється 1-2 рази на тиждень залежно від інтенсивності потовиділення (звичайна або підвищена

пiтливiсть, гiпергiдроз). При рясному потовидiленнi та гiпергiдрозi повторiть зазначену процедуру 2-3 вечора поспiль – для досягнення максимального ефекту. Вiдкритий флакон, яким Ви вже користуєтеся, слiд зберiгати та транспортувати лише у вертикальному положеннi.

### **Застереження**

Антиперспiрант Etiaxil зазвичай не викликає алергiї та при правильному використаннi є ефективним та безпечним засобом вiд поту та запаху. Якщо все-таки якась алергiчна реакцiя виникла, необхідно припинити використання засобу;

Уникайте потрапляння Etiaxil у очi, рот, генiталiї та iншi слизовi оболонки;

Не дозволяйте дiтям користуватися антиперспiрантом Etiaxil. Проблеми з потовидiленням у дiтей рiдко виникають до початку статевої зрiлостi;

Etiaxil може знебарвити деякi тканини одягу, в якому ви спите. Уникайте контакту з коштовностями та полiрованими металевими поверхнями.

### **Може спостерiгатися свербiння:**

Якщо перед застосуванням Etiaxil на шкiрi немає абсолютної сухостi та вiдсутностi пошкоджень;

Якщо пiсля нанесення не дати антиперспiранту Etiaxil повнiстю висохнути;

Якщо застосовується дуже велика кiлькiсть засобу Etiaxil.

### **Умови зберiгання**

Флакон, який вже застосовувався, слiд зберiгати i транспортувати тiльки у вертикальному положеннi з щiльно закритою кришкою при температурi вiд +5С до +25С.