

Склад

Osmolone, піноутворювачі, кондиціонери, допоміжні речовини, ароматизатор, фарнезол, гераніол, лімонен, ліналоол.

Характеристика

Ефективність Паранікс шампунь для лікування при педикульозі є клінічно доведеною: його формула подвійної дії не тільки позбавляє від вошей і гнид, але також є зручною у використанні, оскільки одночасно миє волосся і полегшує вичісування вошей завдяки кондиціонуючим компонентам.

Оскільки Паранікс шампунь для лікування при педикульозі не містить інсектицидів, стійкість вошей до нього не розвивається.

Паранікс шампунь для лікування при педикульозі дерматологічески протестований.

Протипоказання

- у осіб з індивідуальною гіперчутливістю до будь-якого компонента препарату;
- вік дітей до 2 років;

Особливості вказівки

Воші не можуть виробити стійкість до шампуню/спрею Паранікс, оскільки механізм його дії не є хімічним. Тому в разі повторного інфікування людини, яка вже проходила обробку (наприклад в школі від дітей, що не лікувалися), можливе повторне використання шампуню Паранікс без ризику зниження його ефективності.

Шампунь/спрей тільки для зовнішнього використання. При випадковому проковтуванні шампуню/спрею слід звернутися до лікаря. Уникати контакту з очима та слизовими оболонками (рот, ніс). При попаданні засобу в очі негайно промити великою кількістю води. Не застосовувати препарат засіб у разі алергії на будь-який компонент препарату. При раптовій появі висипання, подразнення або інших ознак підвищеної чутливості негайно припинити використання засобу і вимити волосся звичайним шампунем.

Для попередження повторного зараження необхідно провести ретельну обробку всіх речей, які могли мати контакт з волоссям. Гребінці, щітки необхідно

прокип'ятити, а одяг, постільна білизна та рушники - випрати при температурі 60 °С. Приміщення і автомобіль необхідно ретельно проилососити, після чого негайно утилізувати пиловий мішок з пилососа.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Період вагітності і годування груддю не є протипоказанням для використання шампуню/спрею протипедикульозними Паранікс, але в цих випадках рекомендується проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.

Спосіб застосування та дози

1. Перевірити наявність вошей. Струсіть пляшку перед використанням. Рівномірно нанесіть достатню кількість Паранікс шампунь для лікування при педикульозі на сухе волосся, уникаючи ділянки навколо очей. Переконайтеся в тому, що засіб повністю покрив волосся і шкіру голови товстим шаром. Добре помасажуйте волосся від коренів до кінчиків, приділяючи особливу увагу області потилиці і ділянкам за вухами. 200 мл = до 4 використань, в залежності від довжини волосся.
2. Нанесення шампуню. Залиште засіб на волоссі на 15 хв. Це дуже важливо для досягнення результату.
3. Видаліть воші і гниди. Перш ніж мити волосся, використовуйте густий гребінець Паранікс, щоб видалити воші і гниди.
 - розчешіть вологе волосся густим гребінцем проти вошей Паранікс;
 - розділіть волосся на 4 частини: від чола до потилиці, а потім від одного вуха до іншого. Якщо волосся довге, можна заплести кожен частину в косу;
 - обробіть кожен частину, відокремлюючи невеликі пасма так, щоб було видно шкіру голови;
 - розчешіть кожен пасмо, починаючи якомога ближче до шкіри голови;
 - за допомогою гребінця видаліть всі воші і/або гниди, які вдалося знайти;
 - кожен пасмо волосся, на якій немає гнид, можна укласти на одну сторону;
 - щоб уникнути повторного зараження, очищайте гребінець після розчісування кожної пасма за допомогою ватного диска і завжди розчісуйте волосся від коренів волосся до кінчиків.
4. Додайте води і вимийте волосся. Змочіть волосся достатньою кількістю води і добре спіньте. Ретельно вимийте і обполосніть волосся. Обов'язково повністю змийте шампунь. Покладіть волосся як зазвичай.

Побічні реакції

Свербіж і роздратування навколо очей, лущення шкіри голови, контактнк роздратування і почервоніння шкіри голови, вух або шиї.

Упаковка

По 200 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці.

Виробник

Medgenix Benelux NV, Бельгія.