

## **Склад**

Osmolone, піноутворювачі, кондиціонери, допоміжні речовини, ароматизатор, фарнезол, гераніол, лімонен, ліналоол.

## **Характеристика**

Ефективність Паранікс шампунь для лікування при педикульозі є клінічно доведеною: його формула подвійної дії не тільки позбавляє від вошей і гнид, але також є зручною у використанні, оскільки одночасно миє волосся і полегшує вичісування вошей завдяки кондиціонуючим компонентам.

Оскільки Паранікс шампунь для лікування при педикульозі не містить інсектицидів, стійкість вошей до нього не розвивається.

Паранікс шампунь для лікування при педикульозі дерматологічески протестований.

## **Протипоказання**

- у осіб з індивідуальною гіперчутливістю до будь-якого компонента препарату;
- вік дітей до 2 років;

## **Особливості вказівки**

Воші не можуть виробити стійкість до шампуню/спрею Паранікс, оскільки механізм його дії не є хімічним. Тому в разі повторного інфікування людини, яка вже проходила обробку (наприклад в школі від дітей, що не лікувалися), можливе повторне використання шампуню Паранікс без ризику зниження його ефективності.

Шампунь/спрей тільки для зовнішнього використання. При випадковому проковтуванні шампуню/спрею слід звернутися до лікаря. Уникати контакту з очима та слизовими оболонками (рот, ніс). При попаданні засобу в очі негайно промити великою кількістю води. Не застосовувати препарат засіб у разі алергії на будь-який компонент препарату. При раптовій появі висипання, подразнення або інших ознак підвищеної чутливості негайно припинити використання засобу і вимити волосся звичайним шампунем.

Для попередження повторного зараження необхідно провести ретельну обробку всіх речей, які могли мати контакт з волоссям. Гребінці, щітки необхідно

прокип'ятити, а одяг, постільна білизна та рушники - випрати при температурі 60 °С. Приміщення і автомобіль необхідно ретельно проилососити, після чого негайно утилізувати пиловий мішок з пилососа.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Період вагітності і годування груддю не є протипоказанням для використання шампуню/спрею протипедикульозними Паранікс, але в цих випадках рекомендується проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.

## **Спосіб застосування та дози**

1. Перевірити наявність вошей. Струсіть пляшку перед використанням. Рівномірно нанесіть достатню кількість Паранікс шампунь для лікування при педикульозі на сухе волосся, уникаючи ділянки навколо очей. Переконайтеся в тому, що засіб повністю покрив волосся і шкіру голови товстим шаром. Добре помасажуйте волосся від коренів до кінчиків, приділяючи особливу увагу області потилиці і ділянкам за вухами. 200 мл = до 4 використань, в залежності від довжини волосся.
2. Нанесення шампуню. Залиште засіб на волоссі на 15 хв. Це дуже важливо для досягнення результату.
3. Видаліть воші і гниди. Перш ніж мити волосся, використовуйте густий гребінець Паранікс, щоб видалити воші і гниди.
  - розчешіть вологе волосся густим гребінцем проти вошей Паранікс;
  - розділіть волосся на 4 частини: від чола до потилиці, а потім від одного вуха до іншого. Якщо волосся довге, можна заплести кожен частину в косу;
  - обробіть кожен частину, відокремлюючи невеликі пасма так, щоб було видно шкіру голови;
  - розчешіть кожне пасмо, починаючи якомога ближче до шкіри голови;
  - за допомогою гребінця видаліть всі воші і/або гниди, які вдалося знайти;
  - кожне пасмо волосся, на якій немає гнид, можна укласти на одну сторону;
  - щоб уникнути повторного зараження, очищайте гребінець після розчісування кожної пасма за допомогою ватного диска і завжди розчісуйте волосся від коренів волосся до кінчиків.
4. Додайте води і вимийте волосся. Змочіть волосся достатньою кількістю води і добре спінте. Ретельно вимийте і обполосніть волосся. Обов'язково повністю змийте шампунь. Покладіть волосся як зазвичай.

## **Побічні реакції**

Свербіж і роздратування навколо очей, лущення шкіри голови, контактнк роздратування і почервоніння шкіри голови, вух або шиї.

**Упаковка**

По 200 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці.

**Виробник**

Medgenix Benelux NV, Бельгія.