

## **Склад**

Перметрин 1,00 (діюча речовина); ізопарафінов С10-С11 (ізопар) 38,00; масло мінеральне 36,00; спирт ізопропіловий 24,00; віддушка 1,00.

## **Лікарська форма**

Лосьйон-спрей протипедикульозний «Пермін новий» являє собою прозору рідину без сторонніх домішок від безбарвної до світло-жовтого кольору із запахом використанного аромату і спирту.

## **Фармакодинаміка**

Лосьйон-спрей протипедикульозний «Пермін новий» проявляє інсектицидну і овоцидну активність щодо головних вошей.

## **Показання**

Лосьйон-спрей протипедикульозний «Пермін новий» призначений для знищення головних вошей (імаго, личинки, яйця) населенням в побутових умовах.

## **Протипоказання**

Засіб не підлягає використанню для обробки волосся дітям до 3 років, вагітних жінок, жінок-годувальниць, особам з пошкодженням шкіри голови (подряпини, рани, роздратування на уражених педикульозом ділянках тіла), а також особам, котрі виявляють підвищену чутливість до засобу або схильним до алергічних захворювань.

## **Особливості застосування**

Заходи застереження при використанні: засіб використовують тільки наружно. Обработку волосся дітей проводять дорослі. Обробку волосся проводять далеко від джерел відкритого вогню та тепла. Під час обробки волосся необхідно дотримуватися вимог особистої безпеки, спрямованих на запобігання потрапляння лосьйону на відкриті ділянки шкіри і на слизову оболонку очей і верхніх дихальних шляхів. Забороняється приймати їжу, напої і палити під час проведення робіт по обробці волосся засобом. Після нанесення засобу на волосся необхідно вимити обличчя і руки водою з милом. У разі появи симптомів поганого самопочуття необхідно негайно припинити обробку особи, ураженого педикульозом, вивести потерпілу особу на свіже повітря або в приміщення яке

добре провітрюється, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу. При випадковому попаданні засобу в очі необхідно промити очі проточною водою протягом 10-15 хв. У разі випадкового потрапляння засобу на відкриті ділянки шкіри необхідно промити забруднену ділянку шкіри проточною водою. При попаданні засобу на одяг необхідно зняти її, а ділянку шкіри під одягом промити водою. У разі випадкового проковтування кошти необхідно негайно випити кілька склянок води, що містить 10-15 подрібнених таблеток активованого вугілля, а потім шляхом роздратування задньої стінки глотки викликати блювоту. Після промивання шлунка необхідно звернутися до лікаря.

### **Спосіб застосування та дози**

Голову миють звичайним шампунем, промивають водою і просушують рушником. Для обробки дорослих осіб на висушені волосся і шкіру волосяної частини голови рівномірно розпилюють засіб шляхом коротких натиснень на распилітельную головку упаковки і ретельно втирають в коріння волосся. Під час розпилювання кошти упаковку необхідно тримати на відстані 3 см від волосся. Для обробки дітей засіб наносять на ватний, марлевий тампони, спонж або губку шляхом коротких натиснень на распилювальну головку упаковки, рівномірно розподіляють засіб по всій довжині волосся і ретельно втирають в коріння волосся. Норма витрат кошти становить 30-50 см<sup>3</sup> на одну обробку (в залежності від довжини і густоти волосся). З метою запобігання попадання засобу на слизову оболонку очей, носа і ротової порожнини використовують джгут з бавовняної тканини, який обв'язують навколо голови по межі волосяної частини. Через 10 хв засіб змивають проточною теплою водою протягом 2-3 хв, потім миють з використанням шампуню або мила. Волосся ретельно розчісують за допомогою гребеня з метою видалення загиблих комах і гнид (яєць). Повторну обробку проводять за показаннями, але не раніше ніж через 7 діб.

### **Термін придатності**

3 роки.