

## **Склад**

Вода, гліцерин, 1,5-пентандіол, пропіленгліколь, диметикон, ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія, карбомер, натрію гідроксид, полин лікувальний, лист/екстракт стебла.

## **Лікарська форма**

Гель. Засіб для місцевого застосування для профілактики і лікування грибка нігтів.

## **Фармакодинаміка**

### Механізм дії

Вартнер від грибка нігтів пропонує інноваційний підхід до відновлення нігтів, уражених грибком. Унікальна формула допомагає нігтям, що уражені грибком, наступними шляхами:

1. Створює спеціальну плівку, що формує умови, несумісні з існуванням грибка, а також захищає здорові нігті від інфікування.
2. Сприяє регенерації до стану здорових нігтів – завдяки зволожуючим і живильним властивостям його активних інгредієнтів.
3. Перешкоджає росту грибка та подальшому поширенню грибкової інфекції шляхом формування спеціальної плівки, що створює умови, несумісні з існуванням грибка та захищає нігті від зараження грибковою інфекцією.

Його дія зумовлена властивостями плівкоутворюючих силіконових олій та комплексу DS12 Complex™. Ці компоненти створюють непроникну ліпофільну та гідрофобну плівку, що захищає ніготь від оніхомікозу та інших дерматофітів. Вона також перекриває доступ вже існуючим грибкам до кисню та поживних речовин, що знаходяться в живих клітинах шкіри та нігтів, і необхідні для росту та життєдіяльності грибків.

## **Показання**

Позбавляє від усіх видів грибків та перешкоджає поширенню грибкової інфекції на здорові нігті.

Потрійна дія запатентованої формули стимулює швидку регенерацію нігтьової пластини та перешкоджає втраті природнього кольору нігтя.

Гелева текстура не містить кислоти, яка може пошкодити нігтьову пластину під час лікування.

Має приємний запах полину.

### **Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів рецептури препарату. Не наносити на відкриті рани. Для використання в випадках, непередбачених інструкцією (наприклад, у дітей), необхідно проконсультуватися з лікарем. Тільки для зовнішнього застосування.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказань немає.

### **Спосіб застосування та дози**

Перед застосуванням засобу вимийте ретельно руки / ноги за допомогою м'якого миючого засобу. Нанесіть засіб на всю поверхню нігтя за допомогою аплікатора. Дочекайтеся повного висихання засобу і нанесіть повторно. При онихомикозах (грибку нігтів) легкого та середнього ступеня тяжкості засіб застосовується щодня 2 рази в день. Помітний результат з'являється вже через 4 тижні регулярного застосування. Курс застосування слід продовжувати до повного відновлення нігтьової пластини. Тривалість курсу залежить від ступеня ураження і швидкості росту нігтьової пластини. В середньому курс становить 3-6 місяців.

### **Побічні реакції**

В разі виникнення будь-яких побічних дій або непередбачуваних реакцій необхідно терміново проконсультуватися з медичним працівником, якому повинна бути показана упаковка.

### **Умови зберігання**

Зберігати в картонній коробці в сухому місці при кімнатній температурі (5°C – 25°C).

**Упаковка**

Туба з аплікатором 7 мл в картонній упаковці, інструкція для застосування.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

Natumin Pharma AB (Швеція).