

Склад

10 мл крапель містять:

- N-ацетилкарнозин - 1 г;
- Екстракт чорниці - 0,000045 г;
- Хондороїтин сульфат - 0,15 г;
- Натрію фосфат додекагідрат - 1,5 г;
- Натрію фосфат моногідрат - 0,5 г;
- Натрію хлорид - 0,5 г;
- Вода для ін'єкцій доведення до 100%.

Властивості

N-ацетилкарнозин - природний фізіологічний протективний дипептид, який синтезується в організмі людини для захисту різних компонентів і тканин ока від пошкодження різними факторами зовнішнього і внутрішнього середовища і запобігання дегенеративних процесів, пов'язаних зі старінням тканин ока. Зокрема порушує глікірований білок в кришталіку.

Екстракт чорниці. Основними діючими речовинами екстракту чорниці є антоціанозиди, які мають протизапальну і антиоксидантну дію; покращують стан сполучних тканин, зменшують ламкість капілярів і підсилюють гостроту зору при низькій освітленості.

Хондороїтин сульфат - високомолекулярний мукополісахарид, підсилює регенерацію тканин, підвищує стабільність слізної плівки і сприяє поліпшенню мікроциркуляції.

Комплексний вплив таких речовин як N-ацетилкарнозин, екстракт чорниці і хондроїтин сульфату в складі крапель має антиоксидантну дію на органи зору, сприяє підтримці гостроти зору, особливо при вікових змінах в кришталіку, а також в суворих умовах навколишнього середовища або підвищеного навантаження.

Гідратаційна здатність хондроїтину сульфату і вазопротекторні властивості чорниці сприяють регуляції мікроциркуляції і живлення очей.

Завдяки високотехнологічному фільтру розчин без консервантів залишається стерильним протягом всього терміну його використання. Відсутність консервантів допускає часте і тривале використання крапель.

Рекомендації щодо застосування

БІСглік НЕО рекомендується для застосування в комплексній або додатковій терапії при:

- профілактиці прогресування катаракти (різного генезу);
- комплексне лікування і профілактика рефракції (міопія);
- лікуванні комп'ютерного та кліматичного синдромів;
- лікування синдрому сухого ока;
- тривалого використання контактних лінз.

Спосіб застосування

Перед початком застосування необхідно зняти ковпачок з флакона обертовим рухом. При першому використанні рекомендується перевернути флакон наконечником вниз і натискати на флакон до тих пір, поки з отвору наконечника не з'явиться перша крапля. Флакон готовий до подальшого застосування. Рекомендується закапувати по 1 краплі в кожне око 2-3 рази на день по мірі необхідності.

Відразу після використання необхідно закрити флакон ковпачком. Під час закапування слід уникати будь-якого контакту наконечника флакона з очима або шкірою. Розчин може застосовуватися з контактними лінзами.

Застереження

Застереження щодо використання:

- перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем;
- тільки для зовнішнього офтальмологічного застосування;
- необхідно надійно закривати флакон після кожного використання для запобігання його забруднення;
- не слід торкатися крапельницею ока;
- не використовувати флакон, якщо він був пошкоджений і після закінчення терміну зберігання, зазначеного на флаконі;
- необхідно зачекати 10-15 хвилин після застосування, перед застосуванням інших офтальмологічних лікарських препаратів для місцевого застосування;
- продукт стерильний до відкриття флакона, тому необхідно надійно його закривати після використання для запобігання забруднення;
- використовувати не більше 90 днів після відкриття упаковки.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 30 °С в недоступному для дітей місці.

Термін придатності 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.